

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.01
家畜改良センター
令和8年8月4日

JP3H60369 デイ・ロップ・フォース ET

乳量
総合 **+321kg** ± 237 90%R
初産 **+322kg** ± 257 88%R
2産 **+364kg** ± 335 83%R
3産 **+452kg** ± 396 78%R



無脂固形分量
総合 **+29kg** ± 20 **+0.05%** ± 0.28
初産 **+25kg** ± 21 **-0.04%** ± 0.34
2産 **+38kg** ± 28 **+0.05%** ± 0.38
3産 **+49kg** ± 34 **+0.08%** ± 0.43

泌乳持続性
総合 **+0.57** 84%R
初産 **+0.25** 81%R
2産 **+1.51** 77%R
3産 **+1.70** 74%R

乳脂量
総合 **+66kg** ± 10 **+0.48%** ± 0.14
初産 **+55kg** ± 10 **+0.46%** ± 0.17
2産 **+77kg** ± 13 **+0.58%** ± 0.19
3産 **+82kg** ± 16 **+0.57%** ± 0.21

乳蛋白質量
総合 **+19kg** ± 7 **+0.08%** ± 0.11
初産 **+15kg** ± 7 **+0.05%** ± 0.13
2産 **+20kg** ± 10 **+0.07%** ± 0.14
3産 **+24kg** ± 12 **+0.08%** ± 0.16

43牛群 51頭 平均記録数 13
初産記録数 460
2産記録数 198
3産記録数 0



JP5H59513 フラ・リツ・ラ・グ・リ・ ET

乳量
総合 **+1,081kg** ± 260 88%R
初産 **+753kg** ± 298 84%R
2産 **+1,267kg** ± 358 81%R
3産 **+1,484kg** ± 400 78%R



無脂固形分量
総合 **+109kg** ± 23 **+0.14%** ± 0.30
初産 **+82kg** ± 25 **+0.16%** ± 0.39
2産 **+132kg** ± 29 **+0.17%** ± 0.37
3産 **+153kg** ± 34 **+0.18%** ± 0.40

泌乳持続性
総合 **+1.31** 83%R
初産 **+1.90** 76%R
2産 **+2.31** 77%R
3産 **+2.09** 74%R

乳脂量
総合 **+54kg** ± 10 **+0.12%** ± 0.13
初産 **+36kg** ± 11 **+0.06%** ± 0.17
2産 **+62kg** ± 14 **+0.10%** ± 0.17
3産 **+72kg** ± 16 **+0.11%** ± 0.19

乳蛋白質量
総合 **+48kg** ± 7 **+0.12%** ± 0.10
初産 **+37kg** ± 9 **+0.12%** ± 0.14
2産 **+58kg** ± 10 **+0.13%** ± 0.14
3産 **+66kg** ± 12 **+0.13%** ± 0.15

29牛群 33頭 平均記録数 18
初産記録数 305
2産記録数 206
3産記録数 71



JP5H61086 サニ・フィル・FK イン・ルス

乳量
総合 **+1,598kg** ± 291 85%R
初産 **+1,669kg** ± 331 80%R
2産 **+1,733kg** ± 475 67%R
3産 **+1,711kg** ± 533 60%R



無脂固形分量
総合 **+136kg** ± 25 **-0.04%** ± 0.31
初産 **+136kg** ± 27 **-0.12%** ± 0.38
2産 **+145kg** ± 39 **-0.07%** ± 0.47
3産 **+144kg** ± 45 **-0.05%** ± 0.51

泌乳持続性
総合 **+1.92** 71%R
初産 **+2.02** 64%R
2産 **+1.75** 51%R
3産 **+1.65** 49%R

乳脂量
総合 **+57kg** ± 11 **-0.05%** ± 0.14
初産 **+50kg** ± 13 **-0.16%** ± 0.17
2産 **+57kg** ± 19 **-0.10%** ± 0.21
3産 **+58kg** ± 22 **-0.08%** ± 0.24

乳蛋白質量
総合 **+54kg** ± 8 **0.00%** ± 0.11
初産 **+49kg** ± 10 **-0.07%** ± 0.14
2産 **+56kg** ± 14 **-0.02%** ± 0.17
3産 **+56kg** ± 16 **-0.01%** ± 0.19

22牛群 24頭 平均記録数 7
初産記録数 172
2産記録数 0
3産記録数 0



JP3H59306 デイ・ロップ・ドラスティック ET

乳量
総合 **+1,318kg** ± 225 91%R
初産 **+1,129kg** ± 260 88%R
2産 **+1,719kg** ± 297 87%R
3産 **+1,865kg** ± 333 84%R



無脂固形分量
総合 **+134kg** ± 19 **+0.12%** ± 0.25
初産 **+113kg** ± 21 **+0.12%** ± 0.32
2産 **+173kg** ± 24 **+0.17%** ± 0.30
3産 **+190kg** ± 28 **+0.20%** ± 0.32

泌乳持続性
総合 **+0.96** 87%R
初産 **+0.06** 82%R
2産 **+0.95** 84%R
3産 **+0.81** 82%R

乳脂量
総合 **+54kg** ± 9 **+0.01%** ± 0.11
初産 **+47kg** ± 10 **+0.02%** ± 0.15
2産 **+68kg** ± 12 **0.00%** ± 0.14
3産 **+73kg** ± 14 **-0.01%** ± 0.15

乳蛋白質量
総合 **+53kg** ± 7 **+0.09%** ± 0.09
初産 **+46kg** ± 7 **+0.08%** ± 0.12
2産 **+72kg** ± 9 **+0.12%** ± 0.11
3産 **+81kg** ± 10 **+0.15%** ± 0.12

42牛群 48頭 平均記録数 19
初産記録数 425
2産記録数 376
3産記録数 122







注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.02
家畜改良センター
令和8年8月4日







注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。
注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.03
家畜改良センター
令和8年8月4日



注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。
注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。



乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.04
家畜改良センター
令和8年8月4日



JP3H60257 ティ-マ- バルビルク アリ-

乳量	乳脂量
総合 +557kg ± 237 90%R	総合 +47kg ± 10 +0.24% ± 0.14
初産 +602kg ± 262 87%R	初産 +48kg ± 10 +0.26% ± 0.16
2産 +666kg ± 320 85%R	2産 +56kg ± 13 +0.26% ± 0.17
3産 +642kg ± 369 81%R	3産 +55kg ± 15 +0.26% ± 0.19
無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +63kg ± 20 +0.11% ± 0.28	総合 +36kg ± 7 +0.14% ± 0.10
初産 +62kg ± 22 +0.09% ± 0.34	初産 +34kg ± 8 +0.15% ± 0.13
2産 +73kg ± 26 +0.13% ± 0.35	2産 +43kg ± 9 +0.18% ± 0.13
3産 +72kg ± 31 +0.14% ± 0.39	3産 +42kg ± 11 +0.18% ± 0.15
泌乳持続性	38牛群 47頭 平均記録数 15
総合 +1.41 85%R	初産記録数 417
初産 +0.16 81%R	2産記録数 285
2産 +1.19 81%R	3産記録数 12
3産 +0.95 78%R	





JP5H60764 ML サビター-

乳量	乳脂量
総合 +433kg ± 237 90%R	総合 +68kg ± 10 +0.46% ± 0.14
初産 +437kg ± 232 90%R	初産 +63kg ± 9 +0.50% ± 0.15
2産 +305kg ± 393 77%R	2産 +73kg ± 15 +0.56% ± 0.22
3産 +355kg ± 459 70%R	3産 +74kg ± 19 +0.53% ± 0.25
無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +56kg ± 21 +0.15% ± 0.29	総合 +26kg ± 7 +0.13% ± 0.10
初産 +50kg ± 19 +0.12% ± 0.31	初産 +24kg ± 7 +0.10% ± 0.11
2産 +49kg ± 33 +0.20% ± 0.45	2産 +28kg ± 11 +0.16% ± 0.17
3産 +57kg ± 39 +0.23% ± 0.51	3産 +32kg ± 14 +0.18% ± 0.19
泌乳持続性	35牛群 50頭 平均記録数 9
総合 +1.01 80%R	初産記録数 424
初産 +0.10 80%R	2産記録数 11
2産 +1.12 68%R	3産記録数 0
3産 +1.16 65%R	





JP5H60485 ハインツリ- LGND ハスキ- キ71 ET

乳量	乳脂量
総合 +813kg ± 237 90%R	総合 +39kg ± 10 +0.07% ± 0.13
初産 +849kg ± 259 88%R	初産 +31kg ± 10 -0.03% ± 0.15
2産 +286kg ± 341 83%R	2産 +20kg ± 14 +0.08% ± 0.18
3産 +284kg ± 404 77%R	3産 +21kg ± 17 +0.09% ± 0.21
無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +67kg ± 20 -0.02% ± 0.27	総合 +26kg ± 7 +0.01% ± 0.10
初産 +67kg ± 21 -0.09% ± 0.33	初産 +24kg ± 7 -0.05% ± 0.12
2産 +31kg ± 28 +0.05% ± 0.38	2産 +16kg ± 10 +0.06% ± 0.14
3産 +33kg ± 34 +0.07% ± 0.44	3産 +18kg ± 13 +0.08% ± 0.17
泌乳持続性	41牛群 48頭 平均記録数 14
総合 +1.50 84%R	初産記録数 460
初産 +1.31 81%R	2産記録数 190
2産 +1.65 77%R	3産記録数 0
3産 +1.65 73%R	



JP5H59104 WHG アウトレイ レウイン ET

乳量	乳脂量
総合 +463kg ± 249 89%R	総合 +48kg ± 10 +0.26% ± 0.14
初産 +493kg ± 277 86%R	初産 +41kg ± 11 +0.23% ± 0.17
2産 +161kg ± 327 84%R	2産 +37kg ± 13 +0.29% ± 0.18
3産 +205kg ± 362 82%R	3産 +37kg ± 15 +0.26% ± 0.19
無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +41kg ± 21 -0.01% ± 0.29	総合 +24kg ± 7 +0.07% ± 0.11
初産 +40kg ± 23 -0.04% ± 0.36	初産 +22kg ± 8 +0.06% ± 0.13
2産 +20kg ± 27 +0.05% ± 0.37	2産 +18kg ± 9 +0.12% ± 0.14
3産 +22kg ± 30 +0.04% ± 0.40	3産 +18kg ± 11 +0.10% ± 0.15
泌乳持続性	36牛群 39頭 平均記録数 19
総合 -0.01 85%R	初産記録数 351
初産 -0.02 80%R	2産記録数 245
2産 +0.49 81%R	3産記録数 157
3産 +0.40 79%R	



注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線(点線)は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産(0.40)、2産(0.34)、3産(0.26)の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）



NO.05
家畜改良センター
令和8年8月4日JP4H60739 ハル^o-カス デ^oケン

乳量	乳脂量
総合 +354kg ± 249 89%R	総合 +62kg ± 10 +0.47% ± 0.15
初産 -148kg ± 250 89%R	初産 +50kg ± 10 +0.65% ± 0.18
2産 -77kg ± 380 79%R	2産 +53kg ± 15 +0.54% ± 0.22
3産 +56kg ± 444 72%R	3産 +56kg ± 18 +0.49% ± 0.25

無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +59kg ± 21 +0.23% ± 0.30	総合 +31kg ± 7 +0.17% ± 0.11
初産 +11kg ± 21 +0.28% ± 0.36	初産 +15kg ± 7 +0.23% ± 0.13
2産 +23kg ± 32 +0.29% ± 0.45	2産 +17kg ± 11 +0.19% ± 0.17
3産 +38kg ± 38 +0.30% ± 0.51	3産 +22kg ± 14 +0.18% ± 0.19

泌乳持続性
総合 +0.63 81%R
初産 -0.65 81%R
2産 +0.59 70%R
3産 +0.48 68%R

34牛群	53頭	平均記録数
9		
初産記録数	470	
2産記録数	17	
3産記録数	0	



JP4H60041 ス^oライズ^o TMK スマ^oイ^o- ク^oケン

乳量	乳脂量
総合 +302kg ± 237 90%R	総合 +30kg ± 10 +0.18% ± 0.14
初産 +84kg ± 270 87%R	初産 +21kg ± 10 +0.20% ± 0.17
2産 +334kg ± 322 85%R	2産 +36kg ± 13 +0.21% ± 0.17
3産 +325kg ± 363 81%R	3産 +38kg ± 15 +0.22% ± 0.19

無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +42kg ± 20 +0.13% ± 0.29	総合 +25kg ± 7 +0.15% ± 0.11
初産 +22kg ± 22 +0.16% ± 0.38	初産 +18kg ± 8 +0.17% ± 0.14
2産 +43kg ± 26 +0.12% ± 0.36	2産 +23kg ± 9 +0.11% ± 0.13
3産 +43kg ± 31 +0.13% ± 0.40	3産 +23kg ± 11 +0.11% ± 0.15

泌乳持続性
総合 +0.58 85%R
初産 +0.67 81%R
2産 +0.52 81%R
3産 +0.42 79%R

39牛群	43頭	平均記録数
17		
初産記録数	393	
2産記録数	301	
3産記録数	22	



JP3H58612 シマ^oギ^o リジ^oツスタ^o-

乳量	乳脂量
総合 +161kg ± 237 90%R	総合 +45kg ± 10 +0.39% ± 0.14
初産 -125kg ± 281 86%R	初産 +30kg ± 11 +0.41% ± 0.19
2産 +14kg ± 318 85%R	2産 +48kg ± 13 +0.45% ± 0.18
3産 +160kg ± 346 83%R	3産 +54kg ± 14 +0.43% ± 0.19

無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +27kg ± 20 +0.11% ± 0.29	総合 +20kg ± 7 +0.15% ± 0.11
初産 -4kg ± 23 +0.08% ± 0.40	初産 +7kg ± 8 +0.13% ± 0.15
2産 +16kg ± 26 +0.14% ± 0.37	2産 +19kg ± 9 +0.18% ± 0.14
3産 +31kg ± 29 +0.15% ± 0.38	3産 +24kg ± 10 +0.17% ± 0.15

泌乳持続性
総合 +0.11 86%R
初産 -0.71 80%R
2産 -0.05 83%R
3産 -0.06 81%R

30牛群	37頭	平均記録数
23		
初産記録数	338	
2産記録数	293	
3産記録数	228	



JP4H59479 サミ^oトリ^o- ム^o-ソウ^o-カ-

乳量	乳脂量
総合 -79kg ± 249 89%R	総合 +44kg ± 10 +0.45% ± 0.15
初産 -131kg ± 284 85%R	初産 +41kg ± 11 +0.54% ± 0.20
2産 -176kg ± 340 83%R	2産 +44kg ± 13 +0.49% ± 0.20
3産 -199kg ± 382 80%R	3産 +44kg ± 16 +0.49% ± 0.22

無脂固形分量	乳蛋白質量
総合 +14kg ± 22 +0.25% ± 0.32	総合 +18kg ± 7 +0.21% ± 0.12
初産 +7kg ± 23 +0.22% ± 0.41	初産 +13kg ± 8 +0.20% ± 0.15
2産 +10kg ± 28 +0.25% ± 0.40	2産 +18kg ± 10 +0.23% ± 0.15
3産 +11kg ± 32 +0.27% ± 0.44	3産 +18kg ± 12 +0.23% ± 0.17

泌乳持続性
総合 +1.33 84%R
初産 +0.57 79%R
2産 +1.43 79%R
3産 +1.39 77%R

25牛群	37頭	平均記録数
17		
初産記録数	342	
2産記録数	244	
3産記録数	55	







注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線(点線)は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産(0.40)、2産(0.34)、3産(0.26)の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.06
家畜改良センター
令和8年8月4日







注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。
注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）





NO.07
家畜改良センター
令和8年8月4日



注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。
注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.08
家畜改良センター
令和8年8月4日

注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線(点線)は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産(0.40)、2産(0.34)、3産(0.26)の加重平均である。



乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.09
家畜改良センター
令和8年8月4日



JP5H58096 K ホット・ド・パリス ET

乳量	総合	+580kg ± 75	99%R	乳脂量	総合	+36kg ± 3	+0.13% ± 0.04
	初産	+366kg ± 42	99%R		初産	+26kg ± 2	+0.13% ± 0.03
	2産	+701kg ± 127	98%R		2産	+42kg ± 5	+0.13% ± 0.07
	3産	+795kg ± 177	96%R		3産	+49kg ± 7	+0.15% ± 0.09
無脂固形分量	総合	+58kg ± 8	+0.07% ± 0.10	乳蛋白質量	総合	+29kg ± 3	+0.10% ± 0.04
	初産	+40kg ± 4	+0.08% ± 0.06		初産	+23kg ± 1	+0.12% ± 0.02
	2産	+70kg ± 11	+0.07% ± 0.14		2産	+35kg ± 4	+0.10% ± 0.05
	3産	+79kg ± 15	+0.08% ± 0.19		3産	+38kg ± 5	+0.10% ± 0.07
泌乳持続性	総合	-0.18	97%R	767牛群	2,010頭	平均記録数	9
	初産	-0.40	99%R		初産記録数	15,763	
	2産	+0.35	96%R		2産記録数	1,222	
	3産	-0.22	94%R		3産記録数	695	





JP3H58010 アイデール ホット ブーティ ET

乳量	総合	+637kg ± 75	99%R	乳脂量	総合	+47kg ± 3	+0.21% ± 0.04
	初産	+700kg ± 22	99%R		初産	+47kg ± 1	+0.20% ± 0.01
	2産	+578kg ± 35	99%R		2産	+46kg ± 1	+0.21% ± 0.02
	3産	+412kg ± 51	99%R		3産	+41kg ± 2	+0.22% ± 0.03
無脂固形分量	総合	+63kg ± 6	+0.06% ± 0.09	乳蛋白質量	総合	+32kg ± 2	+0.11% ± 0.03
	初産	+65kg ± 2	+0.03% ± 0.03		初産	+32kg ± 1	+0.09% ± 0.01
	2産	+60kg ± 3	+0.08% ± 0.04		2産	+33kg ± 1	+0.12% ± 0.01
	3産	+47kg ± 4	+0.10% ± 0.06		3産	+29kg ± 2	+0.13% ± 0.02
泌乳持続性	総合	-0.03	99%R	2,075牛群	8,253頭	平均記録数	15
	初産	-0.42	99%R		初産記録数	72,644	
	2産	+0.34	99%R		2産記録数	32,824	
	3産	+0.30	99%R		3産記録数	15,376	





JP3H58868 デイ・ロツポ リトルスタ- ET

乳量	総合	+504kg ± 225	91%R	乳脂量	総合	+41kg ± 9	+0.20% ± 0.13
	初産	+424kg ± 253	88%R		初産	+32kg ± 10	+0.16% ± 0.16
	2産	+501kg ± 301	87%R		2産	+47kg ± 12	+0.25% ± 0.16
	3産	+509kg ± 335	84%R		3産	+50kg ± 14	+0.26% ± 0.17
無脂固形分量	総合	+55kg ± 19	+0.11% ± 0.27	乳蛋白質量	総合	+30kg ± 7	+0.13% ± 0.10
	初産	+46kg ± 21	+0.09% ± 0.34		初産	+24kg ± 7	+0.11% ± 0.12
	2産	+53kg ± 25	+0.08% ± 0.33		2産	+30kg ± 9	+0.12% ± 0.12
	3産	+55kg ± 28	+0.09% ± 0.36		3産	+33kg ± 10	+0.14% ± 0.14
泌乳持続性	総合	-0.72	87%R	37牛群	45頭	平均記録数	22
	初産	-1.41	83%R		初産記録数	427	
	2産	-0.57	84%R		2産記録数	343	
	3産	-0.71	82%R		3産記録数	202	



JP3H58995 インシュラス モノ ステラ ET

乳量	総合	+508kg ± 199	93%R	乳脂量	総合	+50kg ± 8	+0.31% ± 0.11
	初産	+404kg ± 207	92%R		初産	+44kg ± 8	+0.30% ± 0.13
	2産	+353kg ± 263	90%R		2産	+47kg ± 10	+0.30% ± 0.14
	3産	+500kg ± 303	87%R		3産	+48kg ± 12	+0.25% ± 0.16
無脂固形分量	総合	+56kg ± 16	+0.13% ± 0.23	乳蛋白質量	総合	+27kg ± 6	+0.11% ± 0.09
	初産	+46kg ± 17	+0.11% ± 0.28		初産	+23kg ± 6	+0.10% ± 0.10
	2産	+47kg ± 22	+0.15% ± 0.30		2産	+25kg ± 8	+0.12% ± 0.11
	3産	+62kg ± 26	+0.16% ± 0.33		3産	+30kg ± 9	+0.12% ± 0.12
泌乳持続性	総合	+0.96	90%R	54牛群	73頭	平均記録数	19
	初産	+0.05	87%R		初産記録数	677	
	2産	+1.34	87%R		2産記録数	455	
	3産	+1.23	85%R		3産記録数	224	







注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線(点線)は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産(0.40)、2産(0.34)、3産(0.26)の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）





NO.10
家畜改良センター
令和8年8月4日

注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線（点線）は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産（0.40）、2産（0.34）、3産（0.26）の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月

検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.11
家畜改良センター
令和8年8月4日

注1) 各形質の産次別の評価値・信頼度ならびに総合と各産次の遺伝能力曲線のパラメータはゲノミック評価値ではありません。

注2) ベース曲線(点線)は、北海道・4月分娩の雌牛における初産・26ヵ月齢、2産・38ヵ月齢、3産・50ヵ月齢の平均的な泌乳曲線の形状で、総合は初産(0.40)、2産(0.34)、3産(0.26)の加重平均である。

乳用牛評価報告 2026-8月
検定済種雄牛（供給可能種雄牛の遺伝能力曲線：総合指数順）

NO.12
家畜改良センター
令和8年8月4日

