

褐毛和種(高知系)の遺伝的能力の推移について

1.はじめに

家畜改良センターでは、肥育農家の同意が得られた枝肉情報等からなる和牛各品種のデータベースを管理・運営しており、褐毛和種(高知系)については、肉用牛枝肉情報全国データベース(以下、「枝肉DB」)を管理・運営しています。枝肉DBを構築するにあたり、肥育者情報、格付情報の調査・入力等については公益社団法人日本食肉格付協会が行い、肥育牛の子牛登記情報の入力等については公益社団法人全国和牛登録協会が行っています。

枝肉DBの目的の一つは、全国的な和牛の改良の動向を把握することにあり、家畜改良センターでは、蓄積されたデータをもとに褐毛和種(高知系)の繁殖雌牛の遺伝的能力(育種価)を評価し、育種価の生年別の平均により示した遺伝的能力の推移についての情報を提供しています。

2.評価方法

(1)評価に用いたデータ

肉用牛改良増殖強化対策事業「優良種雄牛効率選抜・高度利用」で収集されたデータ(1988年6月～2009年12月と畜分)及び枝肉 DB から収集されたデータ(2010年1月～2024年12月と畜分)を対象としています。これら事業で収集されたデータは肥育・と畜された牛の一部であり、全てのと畜された牛をカバーしているわけではありません。

- | | |
|-------------------------|---------|
| ・遺伝的パラメーターの推定及び個体の育種価算出 | 7,393件 |
| ・血縁情報 | 12,943件 |

(2)評価形質

評価した形質の観測値の平均等を表1に示しました。

表1. 各形質の観測値の平均及び標準偏差

形 質	データ数	平均 ±	標準偏差	最小値	最大値
日齢枝肉重量(kg/day)	7,393	0.509 ±	0.064	0.261	0.721
枝肉重量(kg)		441.8 ±	53.5	252.0	636.0
ロース芯面積(cm ²)		50.2 ±	7.4	28	88
バラの厚さ(cm)		7.54 ±	1.01	4.0	11.8
皮下脂肪厚(cm)		2.07 ±	0.73	0.1	5.5
歩留基準値		73.60 ±	1.31	68.8	79.5
BMS(No.)		3.90 ±	1.62	1	12
BCS(No.)		4.21 ±	0.64	2	7
しまり		2.83 ±	0.85	1	5
きめ		2.98 ±	0.85	1	5
と畜時月齢(参考)		28.6 ±	2.1	22.0	37.0

※ 日齢枝肉重量 = 枝肉重量 ÷ と畜日齢

(3) 遺伝的パラメーターの推定

遺伝的パラメーターは、REML法(単形質アニマルモデル)により推定しました(表2)。

表2. 遺伝的パラメーターの推定値

形質名	遺伝率	遺伝分散 (σ_a^2)	表型分散 ($\sigma_a^2 + \sigma_e^2$)
日齢枝肉重量(kg/day)	0.68	0.0026	0.0038
枝肉重量(kg)	0.69	1622.60	2361.87
ロース芯面積(cm ²)	0.61	30.45	49.96
バラの厚さ(cm)	0.52	0.45	0.88
皮下脂肪厚(cm)	0.69	0.40	0.58
歩留基準値	0.72	1.17	1.62
BMS(No.)	0.60	1.40	2.36
BCS(No.)	0.39	0.15	0.38
しまり	0.53	0.33	0.63
きめ	0.51	0.33	0.64

※ 遺伝率 = 遺伝分散(遺伝子が原因のばらつき) ÷ 表型分散(全ばらつき)
どのくらいの割合が遺伝的要因によるものかを示しています。

(4) 育種価の算出

個体の育種価は、上記パラメーターを用いてBLUP法(単形質アニマルモデル)により算出し、2005年から2009年の間に生まれた繁殖雌牛(後代で枝肉成績を有するものが1頭以上存在する個体)の育種価の平均値を0(ゼロ:遺伝ベース)として補正を行いました。なお、遺伝ベースは、過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値として、毎年変更しています。例として、ある個体の枝肉重量の育種価が+10kgであった場合、過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の平均的能力よりも遺伝的に10kg 優れていることを表しています。

枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する繁殖雌牛は3,600頭でした。

3. 育種価の生年別平均の推移について

育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれ、本資料においては、枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する繁殖雌牛の生年別の育種価平均により示しています(表3及び図1)。これは、改良の動向を示すだけでなく、種牛に求められる能力への時代のニーズも反映されています。また、近年におけるトレンドの大きな変動は、頭数が少ないとによる影響も含んでいます。

なお、生年当たりの種雄牛頭数が概ね1~3頭のみであったため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。

表3. 繁殖雌牛の育種価の生年別平均

生年	頭数	日齢 枝肉重量 (kg/day)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	バラの 厚さ (cm)	皮下 脂肪厚 (cm)	歩留 基準値	BMS (No.)	BCS (No.)	しまり	きめ
1991	158	-0.017	-10.491	-2.806	-0.439	-0.028	-0.503	-1.295	0.318	-0.609	-0.647
1992	96	-0.019	-13.632	-2.459	-0.490	-0.042	-0.445	-1.080	0.323	-0.570	-0.623
1993	116	-0.011	-7.072	-2.368	-0.428	0.005	-0.498	-0.945	0.257	-0.470	-0.512
1994	158	-0.009	-7.479	-1.917	-0.362	-0.084	-0.318	-0.724	0.145	-0.327	-0.355
1995	124	-0.012	-9.594	-2.735	-0.426	-0.044	-0.501	-0.663	0.149	-0.308	-0.343
1996	142	-0.014	-11.849	-1.918	-0.338	-0.195	-0.160	-0.309	0.084	-0.143	-0.181
1997	146	-0.005	-5.662	-1.865	-0.234	-0.103	-0.234	-0.289	0.091	-0.141	-0.170
1998	124	-0.009	-7.254	-1.463	-0.218	-0.110	-0.157	-0.159	0.064	-0.084	-0.095
1999	89	-0.008	-8.090	-1.893	-0.215	-0.113	-0.205	-0.190	0.093	-0.133	-0.151
2000	120	-0.009	-8.232	-1.469	-0.151	-0.091	-0.115	-0.119	0.038	-0.062	-0.061
2001	89	-0.002	-3.121	-0.516	-0.128	-0.098	-0.013	-0.089	0.036	-0.055	-0.072
2002	69	-0.006	-5.203	-0.170	-0.030	-0.080	0.089	0.230	-0.031	0.122	0.098
2003	66	-0.004	-5.589	-1.128	-0.034	-0.120	0.001	0.002	0.041	-0.021	-0.026
2004	89	0.002	0.328	0.285	0.018	0.026	0.022	0.061	0.028	0.005	-0.009
2005	56	-0.002	-1.043	0.206	0.005	-0.029	0.063	0.138	-0.013	0.037	0.039
2006	48	0.004	2.317	-0.807	0.021	0.127	-0.235	-0.035	-0.016	0.005	0.019
2007	37	0.002	1.762	-0.390	0.041	0.028	-0.062	-0.199	0.053	-0.094	-0.100
2008	39	-0.003	-3.690	0.817	-0.053	-0.132	0.241	0.005	-0.035	0.028	0.002
2009	27	0.000	0.959	0.364	-0.027	-0.014	0.024	0.041	0.032	0.003	0.019
2010	24	0.000	-1.669	0.507	0.062	-0.222	0.337	0.602	0.041	0.210	0.190
2011	30	-0.004	-5.586	0.426	0.013	-0.168	0.294	0.511	-0.038	0.196	0.172
2012	26	-0.001	-3.287	2.365	0.031	-0.297	0.660	0.245	0.124	0.054	0.003
2013	41	-0.001	-4.514	0.969	0.039	-0.158	0.363	0.694	-0.040	0.281	0.263
2014	27	0.014	10.593	1.153	0.185	-0.133	0.289	0.542	-0.014	0.199	0.131
2015	37	0.013	8.310	0.556	0.114	-0.005	0.070	0.319	-0.067	0.202	0.187
2016	31	0.007	1.177	0.626	0.022	-0.117	0.207	0.417	0.000	0.124	0.120
2017	26	-0.002	-3.711	-1.225	-0.208	-0.081	-0.202	-0.286	0.089	-0.138	-0.175
2018	16	0.021	12.399	-0.011	0.071	0.042	-0.191	0.282	-0.055	0.163	0.148
2019	15	0.011	6.365	0.039	0.016	0.056	-0.143	0.208	-0.021	0.051	0.047

注1) 育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。

2) 生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。


3) 枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。

4) 育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。例えば、2019年の繁殖雌牛の枝肉重量は6.365kgと記載されていますが、2019年生まれの平均的な繁殖雌牛は、過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の平均的能力よりも、遺伝的に6.365kg優れていることを表しています。

5) 繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。

6) 近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

図1. 繁殖雌牛の育種価の生年別平均



注1)育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。

2)生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。


3)枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。

4)育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。

5)繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。


6)近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、加えて、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

(図1. 続き)




- 注1) 育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。
- 2) 生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。
- 3) 枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。
- 4) 育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。
- 5) 繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。
- 6) 近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

(図1. 続き)




- 注1) 育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。
- 2) 生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。
- 3) 枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。
- 4) 育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。
- 5) 繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。
- 6) 近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

(図1. 続き)



- 注1) 育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。
- 2) 生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。
- 3) 枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。
- 4) 育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。
- 5) 繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。
- 6) 近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

(図1. 続き)



- 注1) 育種価の生年別平均の推移は遺伝的トレンドとも呼ばれます。
- 2) 生年当たりの種雄牛頭数が少ないため、種雄牛の遺伝的トレンドは示しておりません。
- 3) 枝肉成績を有する後代が1頭以上存在する個体の育種価のみを平均の算出に用いています。
- 4) 育種価は過去15年前から20年前の間に生まれた繁殖雌牛の育種価の平均値を0として補正しています。
- 5) 繁殖雌牛の後代数等の違いにより、各個体の育種価の正確度にはばらつきがあるため、育種価の生年別平均値の正確性は生年により異なります。例えば、後代1頭きょうだい1頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は低く、後代5頭及びきょうだい10頭の成績に基づいて推定した育種価の正確度は比較的高くなります。正確度が低ければ、新たな後代成績を追加して再評価した際に、評価結果が変動する可能性が高くなり、正確度の低い繁殖雌牛が多い年の育種価平均は、変動する可能性が高くなります。
- 6) 近年におけるトレンドの大きな変動は、平均算出に用いた及び繁殖雌牛の頭数が少ないと、それらの後代頭数が少ないと影響しています。

(参考情報)遺伝相関について

遺伝相関とは2つの形質間の遺伝的な関連性がどの程度なのかを表します。具体的には-1～+1の範囲で示され、遺伝相関が1に近いほど2つの形質は遺伝的な関連性が強く、遺伝的に似た形質であるといえます。また、ある形質間の遺伝相関が高いと、一方の形質を改良することで、他方の形質も間接的に改良を行うことができます。育種改良に役立てていただくために、参考情報として今年度から遺伝相関等に関する情報提供を開始しました。

ただし、遺伝相関は全体としての傾向ですので、個体として考えた場合は必ずしも当てはまるとは限りません。例えば、枝肉重量とバラの厚さは約0.7と比較的1に近い遺伝相関ですが、枝肉重量は大きいけれど、バラの厚さは大きくないという個体もいる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、遺伝相関の推定には、遺伝率と同じ要因を考慮し、2022年12月までにと畜され、異常値等を除外したデータのみ利用し、2形質アニマルモデルの総当たりにより推定しました。推定結果を次ページの参考1及び2に示します。

(参考1) 遺伝相関及び残差相関

形質名	枝肉重量	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	しまり	きめ
枝肉重量	—	0.39	0.69	0.45	-0.17	0.13	-0.03	0.21	0.22	0.22
ロース芯面積	0.52	—	0.38	-0.19	0.73	0.40	-0.24	0.42	0.41	0.41
バラの厚さ	0.74	0.33	—	0.36	0.16	0.34	-0.20	0.46	0.49	0.49
皮下脂肪厚	0.38	0.21	0.28	—	-0.71	-0.08	0.03	0.01	0.03	0.03
歩留基準値	0.21	0.69	0.39	-0.41	—	0.38	-0.24	0.37	0.36	0.36
BMS	0.34	0.29	0.40	0.15	0.27	—	-0.62	0.96	0.94	0.94
BCS	-0.14	0.01	-0.16	-0.11	0.04	-0.14	—	-0.70	-0.73	-0.73
しまり	0.34	0.25	0.38	0.16	0.20	0.68	-0.21	—	0.99	0.99
きめ	0.34	0.24	0.39	0.18	0.18	0.66	-0.26	0.69	—	—

※ 右上:遺伝相関、左下:残差相関

※ 日齢枝肉重量と枝肉重量の遺伝相関:0.999、日齢枝肉重量と枝肉重量の残差相関:0.993

※ 日齢枝肉重量は枝肉重量と同様の傾向を示したため省略

(参考2) 遺伝共分散及び残差共分散

形質名	枝肉重量	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	しまり	きめ
枝肉重量	—	86.428	19.349	11.530	-7.395	6.213	-0.488	4.816	5.171	5.171
ロース芯面積	62.105	—	1.403	-0.661	4.301	2.589	-0.478	1.303	1.273	1.273
バラの厚さ	12.773	0.955	—	0.154	0.120	0.274	-0.051	0.179	0.190	0.190
皮下脂肪厚	4.484	0.394	0.077	—	-0.488	-0.058	0.008	0.004	0.012	0.012
歩留基準値	3.639	2.067	0.171	-0.117	—	0.482	-0.095	0.225	0.216	0.216
BMS	8.773	1.239	0.250	0.059	0.173	—	-0.273	0.647	0.635	0.635
BCS	-1.862	0.029	-0.052	-0.023	0.012	-0.066	—	-0.146	-0.152	-0.152
しまり	5.013	0.610	0.134	0.038	0.073	0.351	-0.055	—	0.324	0.324
きめ	5.175	0.586	0.141	0.042	0.068	0.352	-0.072	0.209	—	—

※ 右上:遺伝共分散、左下:残差共分散

※ 日齢枝肉重量と枝肉重量の遺伝共分散:2.256、日齢枝肉重量と枝肉重量の残差共分散:1.095

※ 日齢枝肉重量は枝肉重量と同様の傾向を示したため省略