

都道府県が保有する系統造成鶏の飼養成績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和5年度調査)

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	福島県	大型しゃも	♂	237	116	48	1,587	119	2,633	25-37	68.6	147	99.3	大型 赤笹 三枚冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	360	344	49	1,307	120	2,148							
		大型しゃも 後継系統	♂	280	118	48	1,722	119	2,754	25-37	69.6	147	97.7	大型 赤笹 三枚冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	不可
			♀	475	454	49	1,414	120	2,157							
	茨城県	J系統	♂	365	230	150	2,200	300	3,500	31-40	43.5	125	98	黒・茶色	ケージ飼育 平飼い	不可
			♀	840	630	150	1,800	300	2,500							
	東京都	J系統	♂	534	78	90	2,410	ND	ND	29-42	27.8	90	81.6	黒・茶色	不断給餌 15週齢以降平飼い	可 (公的研究機関等 のみ)
			♀	466	96	90	1,997	ND	ND							
	三重県	八木戸	♂	300	100	ND	ND	ND	ND	31-40	70.0	42	91.3	中型。黒色。 三枚冠。	ケージ飼養 デビーク	可 (原則県内、個別相 談)
			♀		120	ND	ND	ND	ND							
	奈良県	-	♂	772	65	63	1,465	270	4,050	31-40	54.4	42	96.1	大型、赤笹、三枚冠	不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可
			♀		247	63	1,219	270	2,972							
	徳島県	阿波地鶏	♂	1,000	70	70	2,368	ND	ND	25-64	38.5	70	98.1	赤笹、大型	デビーク 平飼い 不断給餌	不可 (阿波尾鶏協議会 会員に限る)
			♀	1,000	700	70	1,920	ND	ND							
	福岡県	福岡農林試 シャモ	♂	80	52	120	2,312	ND	ND	31-40	68.2	120	94.6	大型、気性荒い 赤笹、クルミ冠	ケージ飼育 デビーク、 5週齢以降制限給 餌	可 (県内指定種鶏場)
			♀	220	162	120	1,879	ND	ND							
	大分県	大分系統	♂	200	20	49	796	175	2,632	25-64	40.0	175	92.0	赤笹、三枚冠	ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	80	49	696	175	1,902							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	NLBC 兵庫牧場	831系統	♂	250	18	104	1,943	217	3,568	31-35	54.1	42	92.9	赤笹	大すう期以降緩やかな制限給餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	300	180	104	1,725	217	2,803							
	NLBC 兵庫牧場	833系統 (大型軍鶏)	♂	255	24	41	1,259	224	3,936	31-35	58.8	42	94.9	黒色、大型	7週齢以降制限給 餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	441	240	41	1,100	224	2,902							
合成種 (軍鶏等)	青森県	横斑シャモ	♂	45	45	42	905	301	4,942	31-40	62.8	140	97.0	大型、おとなしい、 旨味成分で選抜、 横斑紋、三枚冠	不断給餌 単飼ケージ	可(県内指定農場 のみ)
			♀	100	100	42	757	301	3,330							
	山梨県	山梨	♂	81	ND	112	2,019	ND	ND	ND	ND	112	98.1	さつまと戻し交配し 閉鎖群育種	不断給餌	(県内) 甲州地どり生産用 のみ
			♀	81	ND	112	1,718	ND	ND							
		新山梨	♂	169	ND	112	1,992	ND	ND	ND	ND	112	99.4	さつまと山梨シャモ の交配種	不断給餌	造成中のため不可
			♀	156	ND	112	1,852	ND	ND							
	三重県	M系統 合成品種 {(八木戸♂× NH♀)♂×NH ♀}	♂	220	79	70	1,460	210	3,230	31-40	62.0	42	99.1	単冠	ケージ飼養 デビーク	不可
			♀		103	70	1,310	210	2,740							
	鳥取県	T1系統 (軍鶏× RIR)	♂	462	27	42	926	98	2,495	31-40	67.6	42	98.3	産卵性が良い (赤笹、三枚冠)	16週齢以降制限給 餌ケージ飼育(群～ 単飼)	可 (県内地鶏生産者協 議会加入者)
			♀		54		723		2,179							
	山口県	427系統	♂	397	58	140	3,585	280	4,553	31-40	62.7	49	96.8	・黒色 ・単冠 ・イミダペプチドがブ ロイラーより多い	5週齢以降制限給 餌	可 (県内指定の種鶏 場)
			♀		121	140	2,713	280	3,802							
	NLBC 兵庫牧場	834系統	♂	250	18	41	1,341	231	4,288	31-40	53.4	42	97.7	大型	7週齢以降制限給 餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	500	180	41	1,237	231	3,294							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
RIR	北海道	P9系統	♂	152	114	98	2,940	300	4,850	26-43	80.8	120	96.9	ND	ケージ飼育 デビーク 育成期：不断給餌 産卵期：制限給餌	要相談
			♀	743	579	98	2,230	300	3,410							
	岩手県	MO系統	♂	386	40	112	3,100	150	3,836	22-39	74.3	56	98.8	増体系 (大型)	♂：120日以降平飼 い ♀：ケージ飼育	可 (県内、種卵、成鶏、 要問合せ)
			♀	559	200	112	2,313	150	2,604							
	秋田県	RB	♂	163	21	100	2,903	300	4,831	31-40	69.4	100	91.6	増体	120日齢以降平飼い	県内
			♀	422	207	100	2,143	300	3,667							
	福島県	P13系統	♂	286	114	48	1,190	119	2,294	25-37	85.4	147	99.4	濃暗赤色 単冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケ ージ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	428	398	49	1,030	120	1,878							
	埼玉県	埼玉ロード	♂	75	60	140	3,629	300	4,404	31-40	68.5	140	95.4	産卵性及び産肉性 のバランスが良い	全期間ウインドレス 鶏舎飼育	不可
			♀	140	120	140	3,043	300	3,890							
	岐阜県	肉用ロード	♂	224	32	35	914	112	2,616	26-39	80.6	126	97.4	産卵性が良い	5週齢以降制限給 餌(成鶏体重は制 限給餌時のデータ) ケージ飼育	不可
			♀	510	165	35	781	126	2,515							
	愛媛県	ER	♂	160	60	150	2,512	300	3,270	31-40	80.5	150	87.7	産卵率が良い	不断給餌 ケージ飼育	協議による
			♀	276	120	150	1,771	300	2,306							
合成種 (RIR等)	福井県	♂YC ♀ウエミチ レッド	♂	50	20	140	2,226	300	3,114	28	91.0	120	95	単冠 赤褐色	平飼 ケージ飼育	無
			♀	50	20	140	1,624	300	2,224							
	熊本県	九州ロード	♂	160	18	98	2,433	287	5,372	31-40	81.2	98	95.4	濃褐色の羽色 産卵率、増体良好 熊本ロードと兵庫牧 場WPR13系統との 交配	7週齢時以降制限 給餌 雄のみ20週齢時以 降平飼い・不断給餌	可 (県内の希望者に雌 のみ)
			♀	340	90	98	1,922	287	3,929							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種 (RIR等)	大分県	九州ロード	♂	200	15	49	1,110	175	4,129	25-64	73.7	175	94.9	産卵性良い 茶褐色	5週齢以降制限給 餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	75	49	935	175	2,660							
	宮崎県	九州ロード (26世代)	♂	354	63	49	1,571	287	4,573	31-40	91.2	70	97.6	茶～茶褐色 単冠	8週齢以降制限給 餌 14週齢以降ケージ 飼育	可(県内、雌のみ)
			♀	344	120	49	1,119	287	3,538							
BPR	青森県	速羽性横斑 プリマスロッ ク	♂	32	32	42	961	301	5,200	31-40	75.8	140	97.0	旨味成分で選抜、 横斑紋、単冠、速羽 性	不断給餌 単飼ケージ	可(県内指定農場 のみ)
			♀	72	72	42	863	301	3,976							
	新潟県	88系統	♂	80	48	90	1,987	400	3,490	31	70.0	118	90.0	大型、おとなしい 横斑	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	500	450	90	1,690	400	2,692							
	福岡県	福岡農林試 BPR+XA (旧兵庫88 系統)	♂	80	52	120	3,133	ND	ND	24-41	68.9	120	97.1	大型、温順	ケージ飼育 デビーク 5週齢以降制限給 餌	可 (県内指定種鶏場)
			♀	210	167	120	2,405	ND	ND							
	鹿児島県	88系	♂	248	10	56	1,807	280	4,422	21-56	65.1	140	97.1	ND	20週齢以降制限給 餌	鹿児島県地鶏振興 協議会会員で認定 した種鶏場のみ
			♀	243	80	56	1,473	280	3,434							
RC	山梨県	56系統	♂	68	ND	112	2,064	ND	ND	ND	ND	112	96.4	兵庫牧場	5週齢以降制限給 餌	不可
			♀	72	ND	112	1,823	ND	ND							
WPR	山梨県	981系統	♂	42	ND	112	1,887	ND	ND	ND	ND	112	95.3	兵庫牧場	5週齢以降制限給 餌	不可
			♀	64	ND	112	1,810	ND	ND							
名古屋	北海道	N系統	♂	152	114	98	2,330	300	4,370	26-43	68.8	120	96.9	肉用タイプ	ケージ飼育 デビーク 育成期: 不断給餌 産卵期: 制限給餌	要相談
			♀	725	579	98	1,740	300	2,830							
	新潟県	-	♂	80	48	90	1,714	400	3,408	31	68.0	118	92.0	産卵性良い バフ色	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	140	120	90	1,471	400	2,998							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
名古屋	愛知県	NGY1	♂	40	8	150	2,056	270	3,020	26-39	76.4	150	90.5	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	80	43	150	1,736	270	2,302							
		NGY2	♂	150	45	150	2,956	270	3,798	25-40	52.9	150	98.5	肉用タイプ	群飼ケージ	不可
			♀	333	247	150	2,326	290	2,849							
		NGY3	♂	20	20	157	2,668	247	3,922	31-40	67.3	150	100	肉用タイプ バフ色	デビーク、不断給餌 開放鶏舎 ♂ケージ2羽飼い ♀単飼ケージ	不可
			♀	34	33	150	2,382	248	3,409							
		NGY7	♂	233	26	150	3,399	280	4,560	25-40	51.6	150	91.5	肉用タイプ	単飼ケージ	不可
			♀	312	104	150	2,466	280	3,761							
		NGY8	♂	237	28	150	2,898	250	3,840	26-42	74.5	150	98.2	肉用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	381	120	150	2,303	250	3,111							
	三重県	NR系統	♂	331	91	70	1,080	210	2,520	31-40	65.0	42	97.9	ND	ケージ飼養 デビーク	不可
			♀		144	70	910	210	1,950							
	奈良県	-	♂	420	101	63	1,260	270	3,470	31-40	64.4	42	88.1	ND	不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可
			♀		133	63	985	270	2,685							
	愛媛県	N	♂	124	60	150	2,368	300	3,243	31-40	68.3	150	89.7	ND	不断給餌 ケージ飼育	協議による
			♀	233	120	150	1,851	300	2,458							
	NLBC 兵庫牧場	87系統	♂	250	26	104	1,606	217	3,130	31-40	63.16	42	96.0	ND	大すう期以降緩やかな制限給餌 成鶏期以降ケージ飼育	可 (配布時期限定、要問合せ)
			♀	300	156	104	1,409	217	2,345							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種 (名古屋 等)	兵庫県	-	♂	260	40	91	2,800	210	3,600	31-40	76.0	42	97.0	薩摩鶏×名古屋種 食味が良い	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	可 (県内外、種卵、種 すう)
			♀	260	240	91	2,000	210	3,000							
比内鶏	秋田県	HB	♂	187	20	100	2,876	300	4,571	31-40	50.4	100	89.6	増体	120日齢以降平飼い	県内 雄のみ
			♀	533	288	100	2,100	300	3,471							
		HK	♂	192	20	100	2,829	300	4,348	31-40	51.8	100	91.5	ND	120日齢以降平飼い	県内 雄のみ
			♀	444	279	100	2,085	300	3,301							
会津地鶏	福島県	大型 会津地鶏	♂	288	116	48	1,611	119	2,744	25-37	69.6	147	99.4	五色羽装 楊脚 単冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	405	383	49	1,323	120	2,116							
蜀鶏	新潟県	-	♂	160	72	58	696	398	2,965	45	57.0	111	88.0	天然記念物 神経質 長鳴き 黒緑色	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	190	96	58	587	398	2,169							
三河種	愛知県	MK	♂	20	16	182	2,592	270	3,074	26-38	60.0	150	100.0	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	35	35	182	1,991	270	2,300							
ニューハ ンプシャー	奈良県	-	♂	1,008	66	63	1,746	270	3,523	31-40	69.6	42	98.7	ND	不断給餌 デビーク 平飼い 群飼ケージ	不可
			♀		376	63	1,414	270	3,071							
黒柏鶏	山口県	畜試系統	♂	194	33	140	1,813	280	2,321	31-40	44.6	49	84.3	・天然記念物 ・長鳴鶏 ・性格温順 ・緑黒色、・単冠	不断給餌	不可
			♀		67	140	1,293	280	1,871							
讃岐コー チン	香川県	A4系統	♂	100	30	120	2,008	274	3,028	31-40	71.3	120	97.1	単冠、赤耳朵、バフ 色、脚毛あり、脚色 黄色、おとなしい	不断給餌、デビー ク、ケージ飼育	不可
			♀	200	100	120	1,644	274	2,419							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
土佐九斤	高知県	-	♂	50	30	77	880	266	2,700	31-40	40.0	42	80.0	おとなしい	平飼い	県内(種卵のみ)
			♀	120	80	77	680	266	2,200							
対馬地鶏	長崎県	-	♂	64	32	120	1,810	300	3,316	31-40	82.3	120	97.2	在来種 羽色は褐色 肉垂れがなく、顎髭 様の羽毛を有する。	不断給餌 ケージ飼育 デビーク	不可
			♀	306	128	120	1,431	300	2,566							
天草大王	熊本県	原種 天草大王	♂	140	11	98	2,337	287	6,191	31-40	60.9	98	95.7	ランシャン、シャモ、 熊本コーチンの交 配により復元。増体 良好。	7週齢時以降制限 給餌。雄のみ20週 齢時以降平飼い・不 断給餌。	不可
			♀	230	55	98	1,868	287	4,410							
熊本種	熊本県	熊本 コーチン	♂	55	7	98	2,356	287	4,889	31-40	67.6	98	97.5	増体良好。 熊本種を大型に改 良。	7週齢時以降制限 給餌。雄のみ20週 齢時以降平飼い・不 断給餌。	不可
			♀	105	35	98	1,935	287	3,998							
		熊本種	♂	40	8	98	1,980	287	4,124	31-40	63.1	98	99.3	バフ色の羽色	不断給餌	可
			♀	110	40	98	1,605	287	3,296							
地頭鶏	宮崎県	S60	♂	208	10	150	2,940	ND	ND	31-40	35.3	84	95.2	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		69	150	1,955	ND	ND							
		MIX	♂	99	5	150	2,807	ND	ND	31-40	20.7	84	94.9	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		40	150	1,941	ND	ND							
		H15	♂	79	4	150	2,402	ND	ND	31-40	62.8	84	96.2	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		24	150	1,712	ND	ND							
		M28	♂	72	4	150	2,230	ND	ND	31-40	56.6	84	81.9	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		26	150	1,620	ND	ND							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
薩摩鶏	山梨県	-	♂	50	ND	112	2,200	ND	ND	ND	ND	112	80.4	兵庫牧場	不断給餌	不可
			♀	77	ND	112	1,840	ND	ND							
	鹿児島県	赤笹系	♂	236	16	70	1,751	300	4,054	21-56	55.9	150	98.4	赤笹、三枚冠	20週齢以降定量給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	184	80	70	1,437	300	3,361							
合成種 (薩摩鶏等)	鹿児島県	さつま地鶏	♂	227	6	56	1,197	280	3,995	21-56	68.4	140	95.1	食味が良い 赤褐色、三枚冠	20週齢以降定量給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	184	72	56	964	280	2,915							
合成種	大分県	仮称)三元雄系統 (WPR981♂×(RIR86♂×烏骨鶏♀))	♂	200	20	49	983	175	3,927	ND	ND	175	96.8	毛冠、アゴ髭、クルミ冠	5週齢以降制限給餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	80	49	967	175	2,672							
合成種 (岐阜地鶏改良種)	岐阜県	GMB	♂	225	33	35	944	127	2,769	26-39	73.2	139	96.3	増体性が良い	5週齢以降制限給餌(成鶏体重は制限給餌時のデータ)ケージ飼育	不可
			♀	555	177	35	867	139	2,552							

※ 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、NH:ニューハンプシャー種

都道府県における能力検定成績（系統の組合せ検定）

(1)母鶏(2元、3元交配等の採卵用)

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和5年度調査)

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※	え付 羽数	体重				産卵率		育成率		生存率		参考			
			育成鶏		成鶏											
			日 齢	(g)	日 齢	(g)	期間 (週 齢)	(%)	日 齢	(%)	期間 (日 齢)	(%)	組合せの特徴 (羽色等も含む)	飼養管理方法	センター 由来の系統	検定 実施年
北海道	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	79	98	1,330	300	3,680	26-43	85.1	120	100.0	450	90.3	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R2
	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	68	98	1,400	300	3,020	26-43	89.6	120	97.0	450	98	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R3
	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	68	98	1,500	300	2,840	26-43	83.9	120	100.0	450	97.0	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R4
東京都	YA系統(RIR) ×J系統(軍鶏)	1176	ND	ND	ND	ND	34	42.6	117	90.2	201	74.5	ND	不断給餌 15週齢以降平飼い	YA系統(岡 崎) 831系統(兵 庫)	R4
埼玉県	タマシャモ(TS)×埼 玉ロード(RIR)	78	56	1,301	280	3,582	31-40	74.2	112	100	196	98.7	全てクルミ冠 RIR類似の茶褐 色 人に馴れやすい	不断給餌 ケージ飼育	RIR(岡崎、86 系統:兵庫) 軍鶏(831系 統:兵庫)	R3-R4
山口県	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第9世代	142	119	2,126	280	3,200	31-40	69.2	49	100	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R2
	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第10世代	101	120	2,106	280	3,036	31-40	78.6	49	92.1	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R3
	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第11世代	180	120	2,321	ND	ND	ND	ND	49	95.0	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R4
	YC86系統(RIR) ×YC8686系統(RIR) 第5世代	208	119	2,098	280	3,094	31-40	76	49	100	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R2

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※	え付 羽数	体重				産卵率		育成率		生存率		参考			
			育成鶏		成鶏											
			日 齢	(g)	日 齢	(g)	期間 (週 齢)	(%)	日 齢	(%)	期間 (日 齢)	(%)	組合せの特徴 (羽色等も含む)	飼養管理方法	センター 由来の系統	検定 実施年
山口県	YC86系統(RIR) × YC8686系統(RIR) 第6世代	192	120	2,020	280	3,131	31-40	59.7	49	92.7	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R3
	YC86系統(RIR) × YC8686系統(RIR) 第7世代	194	120	2,346	ND	ND	ND	ND	49	92.3	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R4

※ 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、NH:ニューハンプシャー

都道府県における能力検定成績（系統の組合せ検定）
 (2)コマーシャル鶏(2元、3元、4元交配等の肥育用)

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和5年度調査)

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日 齢	体 重 (g)	育 成 率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検定 実施年
北海道	833系統(軍鶏) × (N系統(名古屋) × P9系統(RIR))	北海地鶏Ⅲ (新得地鶏など)	♂:29 ♀:16	83	♂:3,367 ♀:2,759	100.0	2.40	・増体性に優れる ・適度な歯ごたえ ・食味が良い	833系統(兵庫)	R4
岩手県	基礎鶏※ × [(13系統 (WPR)) × MO系統(RIR)] ※軍鶏 × (RC × 岩手地鶏(赤 笹))	南部かしわ	1,810	28	559	99.0	♂:4.4 (4週齢～出 荷時体重 4.8kg) ♀:5.3 (4週齢～出 荷時体重 3.4kg)	天然記念物「岩手地鶏」の羽色 に近く赤笹である。 増体性に優れる。	軍鶏 831系統(兵 庫) RC 56系統(兵庫) WPR 13系統(兵庫) RIR YC系統(岡崎)	H15 (基礎鶏) H28 (ロード)
山形県	♂:シャモ♂ × 名古屋♀ ♀:XA系統(BPR)	やまがた地鶏	5,000	♂:120 ♀:120 -135	♂:4,000 ♀:2,700	ND	♂:3.8 ♀:5.0 (28日齢～ 出荷)	【特徴】 活発だが性質はおとなしく、丈夫 で飼いやすい 【羽色】 ♂は黒白横斑主で一部に茶が 入る。 ♀は黒で頸部に茶が入る	XA系統(岡崎)	H24
東京都	J系統(軍鶏) × (YA系統(RIR) × J系統(軍鶏))	東京しゃも	ND	140	2,897	ND	ND	赤みが濃く、クッキングロスが少 ない。	YA系統(岡崎) 831系統(兵庫)	S63
埼玉県	タマシャモ(TS) × タマシャ モ種鶏(TS × RIR)	彩の国地鶏タマ シャモ	60	112	♂:2,968 ♀:2,237	95.6	3.75	増体性に優れる やや喧騒性がある クルミ冠	RIR(岡崎、86系 統:兵庫) 軍鶏(831系統:兵 庫)	R3
山梨県	山梨シャモ × 981系統(WPR)	甲州地どり	124	119	♂:4,853 ♀:3,409	95.9	4.92	羽毛鑑別可能、大型で飼いやす い	981系統(兵庫)	H29
	新山梨シャモ × 981系統(WPR)	新地どり候補鶏	135	119	♂:4,968 ♀:3,655	96.3	4.38	低腹腔内脂肪、正肉重量増	981系統(兵庫)	H29
	56系統(RC) × 甲州地どり	甲州頬落鶏	154	84	♂:4,161 ♀:3,123	100.0	3.17	赤笹羽装 早熟型で肉質も硬め	56系統(兵庫)	R1

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日 齢	体 重 (g)	育 成 率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検定 実施年
山梨県	56系統(RC) × 新甲州地どり候補鶏	新甲州頬落鶏 候補鶏	155	84	♂:4,296 ♀:3,271	98.0	3.18	赤笹羽装 早熟型で肉質も硬め	56系統(兵庫)	R1
福井県	ウエミチレッド系統(RIR) ♂ × 岡崎おうはん系統 ♀	福地鶏	7,200	ND	ND	ND	ND	450日齢まで採卵鶏として利用し てから肉用に出荷	ND	ND
三重県	合成品種((八木戸 ♂×NH ♀) ♂×NH ♀) ♂× 名古屋種 ♀	熊野地鶏、 松阪地鶏など	70	119	♂:3,298 ♀:2,525	100.0	3.89	肉質は赤身が強く、適度な歯ご たえ。羽毛は褐色。	ND	R2
兵庫県	兵庫 × 981系統(潜性 WPR)	ひょうご味どり	約1.7万	84	3,219	95.8	3.15	増体性に優れる 横斑羽装が出る	薩摩鶏(兵庫) 981系統(兵庫)	R3
	兵庫 × 30系統(顕性WPR)	ニューひょうご 味どり	約1.6万	84	3,167	100.0	2.89	増体性に優れる 白色羽装	薩摩鶏(兵庫) 30系統(兵庫)	R3
鳥取県	合成鶏(軍鶏831・833系統 × RIR86・YA系統) × 13・ 981系統(潜性白WPR)	鳥取地どりピヨ 鹿野地鶏、智頭 宿ぴよ	60	98	♂:4,669 ♀:3,493	97.0	2.8	増体性に優れる 脚弱がまれに発生する	831・833系統(兵 庫)86系統(兵庫) 13・981系統(兵庫) YA系統(岡崎)	R4
山口県	427系統(やまぐち黒鶏 {833系統(軍鶏) × [黒柏 × 86系統(RIR)]} × 981系 (WPR)) × 合成系統(RIR)	長州黒かしわ	73	♂:84 ♀:98	♂:3,540 ♀:3,160	98.6	2.94 (雌雄平均)	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) ・疲労回復成分(イタダキ成分)を 多く含む。 ・羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R2
	427系統(やまぐち黒鶏 {833系統(軍鶏) × [黒柏 × 86系統(RIR)]} × 981系 (WPR)) × 合成系統(RIR)	長州黒かしわ	112	♂:84 ♀:98	♂:3,710 ♀:3,160	97.3	3.15 (雌雄平均)	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) ・疲労回復成分(イタダキ成分)を 多く含む。 ・羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R3

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日 齢	体 重 (g)	育 成 率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検 定 実施年
山口県	427系統(やまぐち黒鶏 [833系統(軍鶏)×〔黒柏× 86系統(RIR)〕]×981系 (WPR))×合成系統(RIR)	長州黒かしわ	748	♂:84 ♀:98	♂:3,320 ♀:3,060	96.4	2.96 (雌雄平均)	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) ・疲労回復成分(イミダペプチド)を 多く含む。 ・羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R4
香川県	A4系統 (86系統RIR×純系讃岐 コーチン)×民間種鶏(WPR)	讃岐コーチン	240	80	♂:4,801 ♀:3,579	96.9	2.60	増体性に優れる	86系統(兵庫)	H26
宮崎県	(S60群(地頭鶏))×(981 系統(WPR))×九州ロード	みやざき地頭鶏	860	♂:100 ♀:120	♂:3,670 ♀:2,708	♂:95.5 ♀:99.0	♂:3.57 ♀:4.31	茶～茶褐色 まだら色	981系統(兵庫)	R4

※1 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、NH:ニューハンプシャー

※2 飼料要求率 = 飼料消費量(kg) / 出荷体重(kg)