

## 都道府県が保有する系統造成鶏の飼養成績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和2年度調査)

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	福島県	大型しゃも	♂	273	135	48	1,480	119	2,860	25-37	62.6	147	98.6	大型赤笹三枚冠	7週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	可 (県内)
			♀	375	364	49	1,250	120	2,240							
		大型しゃも後継系統	♂	224	56	48	1,740	119	2,890	25-37	51.8	147	98.9	大型三枚冠	7週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	不可
			♀	235	206	49	1,430	120	2,320							
	茨城県	J系統	♂	389	216	150	2,200	300	3,500	31-40	52.3	35	83.0	黒・茶色	ケージ飼育 平飼い	不可
			♀	642	488	150	1,800	300	2,500							
	東京都	J系統	♂	499	145	90	1,937	—	—	27-57	28.3	90	86.7	黒・茶色	不断給餌 15週齢以降平飼い	公的研究機関等のみ可能
			♀	511	198	90	1,584	—	—							
	山梨県	山梨	♂	81	—	112	2,019	—	—	—	—	112	98.1	さつまと戻し交配し閉鎖群育種	不断給餌	(県内) 甲州地どり生産用のみ
			♀	81	—	112	1,718	—	—							
		新山梨	♂	169	—	112	1,992	—	—	—	—	112	99.4	さつまと山梨シャモの交配種	不断給餌	造成中のため不可
			♀	156	—	112	1,852	—	—							
	三重県	八木戸	♂	300	100	91	1,120	210	2,050	31-40	58.0	42	95.0	中型、黒色、味が良い、気性が荒い	ケージ飼育 デビーク	可 (原則県内、個別相談)
			♀		120	91	823	210	1,530							
奈良県	—	♂	360	29	63	1,350	280	3,844	31-40	56.2	42	98.9	大型、赤笹等、三枚冠	不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可	
		♀		123	63	1,169	280	2,986								
徳島県	阿波地鶏	♂	1,000	70	70	2,347	—	—	25-64	38.6	70	97.9	赤笹、大型	デビーク 平飼い 不断給餌	不可 (阿波尾鶏協議会会員に限る)	
		♀	1,000	700	70	1,847	—	—								

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	福岡県	福岡農林試 シャモ	♂	119	56	120	2,833	—	—	31-39	38.6	120	97.5	大型、気性荒い 赤笹、クルミ冠	ケージ飼育 デビュー 5週齢以降制限給餌	可 (県内指定種鶏場)
			♀	238	160	120	2,290	—	—							
	大分県	大分系統	♂	200	20	49	894	175	3,442	30-40	57.7	49	94.2	赤笹、三枚冠	7週齢以降制限給仕、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	80	49	760	175	2,491							
	NLBC 兵庫牧場	831系統	♂	251	18	105	2,082	224	3,592	31-35	51.5	42	98.5	赤笹	大すう期以降緩やかな制限給餌 平飼い	可 (配布時期限定、要問合せ)
			♀	304	198	105	1,649	224	2,795							
	NLBC 兵庫牧場	833系統 (大型軍鶏)	♂	250	24	42	1,106	217	3,708	31-35	44.5	42	94.8	黒色、大型	7週齢以降制限給餌 平飼い	可 (配布時期限定、要問合せ)
			♀	518	240	42	959	217	3,505							
合成種 (軍鶏等)	青森県	横斑シャモ	♂	26	26	42	800	210	4,743	31-40	63.9	27	97.8	大型、大人しい、旨味成分で改良、横斑紋、三枚冠	不断給餌 ケージ飼育	可 (県内指定農場のみ)
			♀	67	62	42	706	210	3,401							
	鳥取県	T1系統	♂	530	27	42	927	98	2,973	33-38	76.8	42	98.9	産卵性が良い (赤笹、三枚冠)	18週齢以降制限給餌ケージ飼育(群~単飼)	不可
			♀		54	42	781	98	2,222							
	山口県	423系統	♂	115	24	140	3,696	280	4,786	31-40	61.3	49	89.2	・黒色 ・単冠 ・イミダペプチドがブロイラーより多い	5週齢以降制限給餌	可 (県内指定の種鶏場)
			♀		31	140	2,576	280	3,621							
		427系統	♂	421	49	140	3,880	280	4,886	31-40	56.2	49	97.6	・黒色 ・単冠 ・イミダペプチドがブロイラーより多い	5週齢以降制限給餌	可 (県内指定の種鶏場)
			♀		84	140	3,128	280	3,941							
	NLBC 兵庫牧場	834系統	♂	250	18	42	1,472	210	4,374	31-40	51.2	42	97.2		7週齢以降制限給餌 平飼い	可 (配布時期限定、要問合せ)
			♀	510	198	42	1,268	210	3,418							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
RIR	北海道	P9系統	♂	161	116	98	2,766	300	4,347	181-300日齢	82.6	120	93.2		ケージ飼育 デビーク 育成期: 不断給餌 産卵期: 制限給餌	不可
			♀	760	574	98	2,039	300	2,974							
	岩手県	MO系統	♂	365	40	112	2,951	150	3,535	150-270日齢	85.6	112	98.4	増体系(大型)	♂: 120日以降 平飼い ♀: ケージ飼育	可 (県内、種卵、成鶏、要問合せ)
			♀	518	200	112	2,133	150	2,484							
	秋田県	RB	♂	160	21	100	2,802	300	4,457	31-40	60.2	100	91.6	増体	120日齢以降平飼い	県内
			♀	765	315	100	2,127	300	3,683							
	福島県	P13系統	♂	329	115	48	1,190	119	2,510	25-37	85.0	147	98.0		7週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	可 (県内)
			♀	607	410	49	970	120	1,930							
	茨城県	L系統	♂	143	80	150	2,100	300	2,800	31-40	76.1	35	88.0	卵用タイプ おとなしい	ケージ飼育	不可
			♀	455	360	150	1,700	300	2,900							
	埼玉県	埼玉ロード	♂	120	80	84	2,410	—	—	31-40	70.0	120	98.0	産卵性及び産肉性のバランスが良い	全期間ウインドレス 鶏舎飼育	不可
			♀	220	180	84	1,860	—	—							
	岐阜県	肉用ロード	♂	246	32	35	867	125	2,656	27-40	77.8	128	98.2	産卵性が良い	5週齢以降制限給餌(成鶏体重は制限給餌時のデータ) ケージ飼育	不可
			♀	546	160	35	730	131	2,282							
愛媛県	ER	♂	91	60	150	2,565	300	3,566	150-300日齢	84.3	120	87.2	産卵率が良い	不断給餌 ケージ飼育	協議による	
		♀	264	120	150	1,781	300	2,480								
合成種 (RIR等)	千葉県	レッドラインロード(RIR×レッドライン)	♂	50	15	140	2,574	300	3,673	31-40	87.2	140	92.5	褐色 淡褐色卵 産卵性が良い 単冠	不断給餌 デビーク ケージ飼育	不可
			♀	160	75	140	2,212	300	2,646							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種 (RIR等)	福井県	♂YC ♀ウエミチ レッド3号	♂	50	20	140	2,226	300	3,114	28	91.0	-	100	単冠 赤褐色	平飼 不断給餌	無
			♀	50	20	140	1,624	300	2,224							
	熊本県	九州 ロード	♂	250	18	98	2,267	287	4,970	31-40	76.4	98	96.0	濃褐色の羽色、産卵率、増体良好 熊本ロードとWPR(13系統・兵庫)との交配	7週齢時以降制限給餌 雄のみ:20週齢時以降平飼い・不断給餌	県内の希望者に雌のみ譲渡可
			♀	430	90	98	1,845	287	3,854							
	大分県	九州 ロード	♂	200	15	49	904	175	3,674	30-40	74.8	49	91.7	産卵性良い 茶褐色	5週齢以降制限給餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	75	49	812	175	2,621							
	宮崎県	24世代	♂	245	9	49	1,386	287	4,393	31-40	91.2	28	99.3	茶～茶褐色 単冠	8週齢時以降制限給餌 ♂:ケージ飼養 ♀:平飼い、ケージ飼養	可 (県内、雌のみ)
			♀	245	24	49	1,072	287	3,294							
BPR	青森県	速羽性横斑 プリマスロック	♂	39	20	140	4,143	210	4,415	21-32	88.9	27	98.1	旨味成分で改良、横斑紋、単冠、速羽	6-17週齢制限給餌 ケージ飼育	可 (県内指定農場のみ)
			♀	123	116	140	3,487	210	4,043							
	千葉県	千葉×兵庫 ×岡崎系	♂	40	6	140	3,254	300	4,208	31-40	84.2	140	84.4	黒白横斑 淡褐色卵 単冠	不断給餌 デビーク ケージ飼育	不可
			♀	90	30	140	2,440	300	3,171							
	新潟県	88系統	♂	60	50	90	2,185	400	3,371	31	77.0	120	98.0	大型、おとなしい 横斑	5週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	500	480	90	1,659	400	2,855							
	福岡県	福岡農林試 BPR+XA (旧兵庫88) 系統	♂	120	54	120	2,430	-	-	-	-	120	91.1	大型、温順、横斑太い	ケージ飼育 デビーク 5週齢以降制限給餌	可 (県内指定種鶏場)
			♀	241	161	120	2,400	-	-							
	鹿児島県	88系	♂	274	10	56	1,826	280	4,339	20-57	60.5	140	87.3		20週齢以降制限給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	287	70	56	1,409	280	3,334							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
RC	山梨県	56系統	♂	68	—	112	2,064	—	—	—	—	112	96.4	兵庫牧場由来	5週齢以降制限給餌	不可
			♀	72	—	112	1,823	—	—	—	—	—	—			
WPR	山梨県	981系統	♂	42	—	112	1,887	—	—	—	—	112	95.3	兵庫牧場由来	5週齢以降制限給餌	不可
			♀	64	—	112	1,810	—	—	—	—	—	—			
名古屋	北海道	N系統	♂	165	114	98	2,407	300	3,990	181-300日齢	69.2	120	97.6	肉用タイプ	ケージ飼育 デビーク 育成期: 不断給餌 産卵期: 制限給餌	不可
			♀	705	574	98	1,727	300	2,780							
	茨城県	T系統	♂	143	92	150	2,500	300	3,400	31-40	64.7	35	95.0	卵用タイプ おとなしい	ケージ飼育 平飼い	不可
			♀	255	203	150	2,100	300	2,500							
	新潟県	—	♂	60	50	90	1,632	400	3,185	31	73.0	120	96.0	産卵性良い バフ色	5週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	120	100	90	1,324	400	2,948							
	愛知県	NGY1	♂	41	8	150	2,447	250	3,059	26-43	73.4	—	—	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	121	43	150	1,932	250	2,447							
	愛知県	NGY2	♂	180	45	150	3,090	270	4,050	181-280日齢	56.9	150	94.1	肉用タイプ バフ色	群飼ケージ	不可
			♀	425	321	150	2,280	270	3,050							
	愛知県	NGY3	♂	82	15	150	3,422	250	4,242	26-43	67.1	—	—	肉用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	200	44	150	2,614	250	3,534							
	愛知県	NGY7	♂	235	26	190	4,016	270	4,575	181-280日齢	61.4	150	92.4	肉用タイプ バフ色	単飼ケージ	不可
			♀	311	104	190	3,204	270	3,556							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考			
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性	
						日齢	(g)	日齢	(g)								
名古屋	愛知県	NGY8	♂	256	30	150	2,911	250	3,703	26-43	62.4	150	98.9	肉用タイプ バブ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可	
			♀	374	132	150	2,471	250	3,226								
	奈良県	-	-	♂	360	71	63	1,075	270	3,422	31-40	59.5	42	98.1		不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可
				♀		71	63	868	270	2,597							
	愛媛県	N	-	♂	190	80	150	2,421	300	2,884	150-300 日齢	71.3	120	97.6		不断給餌 ケージ飼育	協議による
				♀	308	160	150	2,065	300	2,359							
	NLBC 兵庫牧場	87系統	-	♂	250	26	105	1,694	224	3,146	31-40	69.1	42	97.5		大すう期以降緩やかな制限給餌 成鶏期以降ケージ飼育	可 (配布時期限定、要問合せ)
				♀	300	156	105	1,392	224	2,723							
合成種 (名古屋等)	兵庫県	-	♂	320	50	91	2,800	210	3,600	31-40	64.0	91	95.0	薩摩鶏×名古屋種 食味が良い	5週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	可 (県内外、種卵、種すう)	
			♀	320	300	91	2,000	210	3,000								
比内鶏	秋田県	HB	♂	165	20	100	2,747	300	4,277	31-40	45.9	100	90.6	増体	120日齢以降平飼い	県内 雄のみ	
			♀	842	300	100	2,055	300	3,375								
		HK	♂	164	20	100	2,607	300	4,065	31-40	46.1	100	94.0	120日齢以降平飼い	県内 雄のみ		
			♀	749	300	100	1,974	300	3,152								
	NLBC 兵庫牧場	81系統	-	♂	101	20	105	1,606	210	3,234	31-40	36.8	42	95.0	大すう期以降緩やかな制限給餌 成鶏期以降一部ケージ飼育	不可	
				♀	103	60	105	1,354	210	2,859							
会津地鶏	福島県	大型会津地鶏	♂	516	116	48	1,450	119	2,570	25-37	69.9	147	96.4	五色羽装 楊柳足 単冠	7週齢以降制限給餌、デビーク、ケージ飼育	可 (県内)	
			♀	424	420	49	1,220	120	1,990								

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
蜀鶏	新潟県	—	♂	130	50	90	1,273	400	2,720	40	56.0	120	85.0	天然記念物 長鳴き 黒緑色	5週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	160	80	90	1,059	400	2,523							
三河種	愛知県	MK	♂	33	10	—	—	270	3,388	26-38	65.8	150	88.0	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	88	38	—	—	270	2,621							
ニューハンプシャー	奈良県	—	♂	1,080	65	63	1,680	280	3,741	31-40	63.7	42	99.2		不断給餌 デビーク 平飼い 群飼ケージ	不可
			♀		384	63	1,336	280	3,224							
黒柏鶏	山口県	畜試系統	♂	95	20	140	1,786	280	2,504	31-40	48.6	49	72.6	・天然記念物 ・長鳴鶏 ・性格温順 ・緑黒色 ・単冠	不断給餌	不可
			♀		27	140	1,360	280	1,995							
讃岐コーチン	香川県	A4系統	♂	150	50	42	603	119	3,364	31-40	59.3	140	87.9	単冠、赤耳朵、バフ色、脚毛あり、脚色黄色、おとなしい	不断給餌、デビーク、ケージ飼育	不可
			♀	200	100	42	520	119	2,692							
土佐九斤	高知県	—	♂	50	30	77	880	266	2,700	31-40	40.0	42	80.0	おとなしい	平飼い	県内(種卵のみ)
			♀	120	80	77	680	266	2,200							
	NLBC 兵庫牧場	80系統	♂	121	20	105	1,660	224	3,280	31-40	51.8	42	98.4		大すう期以降緩やかな制限給餌 成鶏期以降一部ケージ飼育	不可
			♀	129	60	105	1,399	224	2,869							
対馬地鶏	長崎県	—	♂	96	48	120	1,810	300	3,316	31-40	81.4	120	97.2	在来種 羽色は褐色 肉垂れがなく、顎髭様の羽毛を有する	不断給餌 ケージ飼育 デビーク	不可
			♀	306	128	120	1,431	300	2,566							
天草大王	熊本県	天草大王	♂	185	11	98	2,242	287	5,498	31-40	59.5	98	92.9	ランシャン、シャモ、熊本コーチンの交配により復元 増体良好	7週齢時以降制限給餌 雄のみ、20週齢時以降平飼い・不断給餌	不可
			♀	223	55	98	1,764	287	4,256							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付羽数	最終選抜羽数	育成鶏		成鶏		期間(週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴(羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
熊本種	熊本県	熊本コーチン	♂	80	8	98	2,129	287	4,684	31-40	65.5	98	96.8	増体良好 熊本種を大型に改良	7週齢時以降制限給餌 雄のみ、20週齢時以降平飼い・不断給餌	不可
			♀	106	40	98	1,752	287	3,918							
		熊本種	♂	40	8	98	1,947	287	3,612	31-40	72.0	98	92.1	バフ色の羽色	不断給餌	希望者に譲渡可
			♀	100	40	98	1,569	287	3,051							
地頭鶏	宮崎県	S60	♂	300	10	150	2,461	—	—	31-40	35.7	62	97.0	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		71	150	1,837	—	—							
		H15	♂	200	10	150	2,594	—	—	31-40	56.9	62	96.5	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		80	150	1,814	—	—							
		MIX	♂	229	10	150	2,501	—	—	31-40	47.9	62	93.0	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		76	150	1,834	—	—							
		M28	♂	200	10	150	2,183	—	—	31-40	52.8	62	94.0	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀		80	150	1,814	—	—							
薩摩鶏	山梨県	—	♂	78	—	112	2,254	—	—	—	—	112	80.8	兵庫牧場由来	不断給餌	不可
			♀	89	—	112	2,012	—	—							
	鹿児島県	赤笹系	♂	205	16	70	1,667	300	4,068	21-56	55.2	150	99.7	(赤笹, 三枚冠)	20週齢以降制限給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	215	80	70	1,277	300	3,467							
合成種(薩摩鶏等)	鹿児島県	さつま地鶏	♂	278	6	56	1,197	280	3,792	20-56	66.7	140	99.4	食味が良い(赤褐色, 三枚冠)	20週齢以降制限給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	216	72	56	984	280	3,201							



品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種	大分県	仮称)三元雄系統 (WPR981 × (RIR86♂ × 烏骨鶏♀))	♂	200	15	49	1,006	175	3,593	—	—	49	85.5	毛冠、アゴ髭、クルミ冠	5週齢以降制限給餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	75	49	878	175	2,817							
合成種 (岐阜地鶏改良種)	岐阜県	GMB	♂	223	32	35	979	125	2,840	27-40	71.5	126	96.1	増体性が良い	5週齢以降制限給餌(成鶏体重は制限給餌時のデータ)ケージ飼育	不可
			♀	554	160	35	840	127	2,305							

※ 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ