

都道府県等における地鶏、銘柄鶏の生産利用状況(卵用及び卵肉兼用を含む) 令和元年度実績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和2年度調査)

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴		センター由来の品種(系統・牧場)	
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
							♂											♀
北海道	北海地鶏Ⅱ(肉用)	① ② ③	♂系:名古屋 ♀系:軍鶏×RIR	道畜産試験場 家畜改良センター	道畜産試験場 民間種鶏場	120	3,200	2,600	93	—	十勝・新得 フレッシュ地鶏 事業協同組合など	14	13,000	12,000	道内 首都圏	歯ごたえがあり 脂ののりがよい	飼育面積が広い	軍鶏(833系統・兵庫)
青森県	青森シャモロック	① ② ③	♂系:横斑シャモ ♀系:速羽性プリマスロック	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	♂:100 ♀:120	3,000	2,500	—	—	青森シャモロック生産者協会	8	24,720	—	県内 首都圏 名古屋 大阪	ムネ、モモの肉付きがよい	雌雄ともに横斑紋、三枚冠、飼育面積5羽/m ² 、仕上げにガーリック粉末給与	軍鶏(833系統・兵庫)
岩手県	南部かしわ(肉用)	① ② ③ ④	♂系:基礎鶏(軍鶏×(RC×岩手地鶏)) ♀系:WPR×RIR	岩手県農業研究センター畜産研究所	岩手県農業研究センター畜産研究所	♂:90 ♀:120	2,800g以上	2,800g以上	99 (28日齢育成率)	—	岩手しずく いし南部 かしわ生 産組合他	8	1,700	1,700	県内 首都圏	肉味がよい 産肉性に富む	岩手地鶏を利用し基礎鶏を作出	軍鶏(831系統・兵庫) RC(56系統・兵庫) WPR(13系統・兵庫)
秋田県	比内地鶏(肉用鶏)	① ②	♂系:比内鶏 ♀系:RIR	県試験場	県内ふ化場(6組織)	♂:100 ♀:150	—	2,700	♀:90	—	県内各JAの生産部会など	96	—	55.1万	全国	食味がよい 歯ごたえがあり ジューシー	県のブランド認証制度の基準に沿って飼育されている	
山形県	やまがた地鶏(肉用)	① ② ④	♂系:赤笹軍鶏 ♂×名古屋♀ ♀系:BPR	県研究所	県研究所 岡崎牧場	♂:120 ♀:120 ~135	4,000	2,700	—	62.3 (40~53週齢)	やまがた地鶏振興協会	21	6,000	6,000	県内 首都圏	肉は赤身を帯び 適度な歯ごたえ がある 旨味系のアミノ酸(特にグルタミン酸)の組成割合が比較的多い	父系の軍鶏は赤笹系で、山形県庄内地方遊佐町の愛好家が長年維持・保存してきたもの	BPR(XA系統・岡崎)
福島県	会津地鶏(肉用)	① ②	♂系:大型会津地鶏(会津地鶏×WPR) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:100 ~130 ♀:100 ~148	3,700	2,700	94	—	会津養鶏協会、(株)会津地鶏ネット、(有)会津地鶏みしまや	10	29,000	27,300	県内 首都圏	脂ののりがよい コク、旨みに優れる	美しい羽装を持つ、強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
	川俣シャモ(肉用)	① ②	♂系:大型しゃも(RC×軍鶏) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:110 ~114 ♀:110 ~114	3,800	2,600	99	—	(株)川俣町農業振興公社、川俣シャモファーム、川俣シャモ振興会	14	56,600	55,800	県内 首都圏	歯ごたえがある 脂ののりがよい コク、旨みに優れる	飼育面積が広い 強健で飼いやすい	RC(56系統・兵庫)
茨城県	奥久慈しゃも(肉用)	① ② ④	♂系:J系軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	茨城県畜産センター	奥久慈しゃも生産組合	♂:125 ♀:155	2,600	2,200	87	79 (180~300日齢)	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	10	51,000	47,000	県内 首都圏	低脂肪で歯ごたえがあり、味にコクがある	飼育面積が広い 飼育期間が長い	

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
							♂	♀										
栃木県	栃木しゃも	④	♂系:シャモ ♀系:プレノール×RIR	兵庫牧場 民間種鶏場	民間種鶏場	♂:112 ♀:126	2,400~ 2,600	1,700~ 1,900	—	—	栃木しゃも普及推進協議会	3	—	7,793 (ヒナ配布数)	県内及び首都圏	適度な歯ごたえがあり、コクと旨みにより風味良好	収容密度 25羽以下/3.3㎡	RIR(86系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
群馬県	上州地鶏(肉用)	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RC♂×WPR♀	県試験場	県試験場	110	—	—	—	—	群馬県地鶏生産普及協議会	3	30,000	28,000	県内首都圏	発育良好		軍鶏(833系統・兵庫)
埼玉県	彩の国地鶏 タマシャモ	① ② ③ ④	♂系:タマシャモ ♀系:タマシャモ×RIR	埼玉県農業技術研究センター	埼玉県農業技術研究センター	♂♀:150日以上	3,800	2,800	80	62.4 (R1.12~R2.5)	彩の国地鶏タマシャモ普及協議会	5	23,195	(18,500)	県内東京都内	濃厚な旨みと歯応え(プロイラーに比べてイノシン酸、アラキドン酸が多い)	飼育期間が長い(150~180日) 飼育密度が低い	RIR(YA系統・岡崎)、86系統・兵庫
千葉県	房総地どり(兼用)	① ② ③ ④	♂系:BPR ♀系:RLR(レッドラインロード)	千葉県畜産総合研究センター	千葉県畜産総合研究センター	♂:110 ♀:120	2,600	1,800	—	—	—	14	1,115	—	県内	肉は程良く締まり、ジューシー、風味に富み、旨みがある	強健性に富み、飼育管理がしやすい、おとなしい	
	アローカナ交雑鶏(卵用)	② ③ ④	♂系:WA(AR×WL) ♀系:RLR(レッドラインロード)	千葉県畜産総合研究センター	千葉県畜産総合研究センター	—	—	—	—	—	—	22	5,813	—	県内	産卵率、卵重、飼料要求率は良好		
東京都	東京しゃも	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×軍鶏	青梅畜産センター	青梅畜産センター	120~140	2,200~ 2,400	2,200~ 2,400	—	—	東京しゃも生産組合	4	—	24,495	首都圏	赤みが濃く、クッキングロスが少ない。	指定配合飼料の給与(60日齢から)。軍鶏由来の血液が75%。	RIR(YA系統・岡崎) 軍鶏(831系・兵庫)
神奈川県	かながわ鶏(かながわどり)(肉用)	③ ④	♂系:軍鶏(833系統) ♀系:岡崎おうはん(XSYC)	兵庫牧場岡崎牧場	神奈川県畜産技術センター	90日以上	2,500	2,300	—	77.7(30~52週齢、9月え付) 91.8(30~58週齢、3月え付)	かながわ鶏生産組合	6	2,150 (R1年度)	2,900 (R1年度)	県内	味(旨味)と歯ごたえ	かながわ生まれ、かながわ育ち、かながわで食す	軍鶏(833系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
山梨県	甲州地どり	①	♂系:山梨シャモ ♀系:WPR	県センター 兵庫牧場	民間種鶏場	119	4,200	3,100	96	—	甲州地どり生産組合	7	(平均飼養羽数 3,500)	25,000	県内首都圏	歯ごたえあり	県農産物認証	WPR(981系統・兵庫)
長野県	信州黄金シャモ(肉用)	③	♂系:シャモ ♀系:名古屋種	兵庫牧場 長野畜試	長野畜試	♂:112日 以上 ♀:120日 以上	3,600	2,400	—	—	—	—	—	17,000	県内中心	肉味がよい。歯ごたえがある。脂肪が少ない。	飼育者認定、飼育統一基準	シャモ(833系統・兵庫) 名古屋種(87系統・兵庫)
	しなの鶏(肉用)	③	♂系:シャモ ♀系:WPR	兵庫牧場	長野畜試	90	4,000	3,000	—	—	—	—	—	6,000	県内中心	肉味がよい		シャモ(833系統・兵庫) WPR(1613系統・兵庫)

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
							♂	♀										
静岡県	駿河シャモ(肉用)	① ② ④	軍鶏、名古屋種、RIR、BPR等の合成鶏	静岡県中小家畜研究センター	静岡県中小家畜研究センター	112	3,000	2,400	95以上	65(180~500日齢)	駿河シャモ振興会	4	—	7,800	県内首都圏	肉味がよい、噛み応えがある	茶葉給与、黒い羽毛、脚	RC(56系統・兵庫)
新潟県	にいがた地鶏(肉用)	① ② ③ ④	♂系:蜀鶏×名古屋種 ♀系:横斑プリマスロック	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	120	3,000	—	—	—	にいがた地鶏生産普及研究会	5	4,200	4,900	県内	旨味成分が多い 脂肪が少ない しっかりと歯ごたえ	全期間無薬飼料 在来種100%	BPR(88系統・兵庫)
福井県	福地鶏(兼用)	① ④	♂系:ウエミチレッド(RIR) ♀系:岡崎おうはん	岡崎牧場	民間種鶏場	♀:450~500	—	2.4kg	94	81(21~70週齢)	福地鶏推進協議会	14	5,000	4,500	県内	卵肉兼用		RIR(YC系統・岡崎) 岡崎おうはん(岡崎)
岐阜県	奥美濃古地鶏(肉用)	① ② ④	♂系:岐阜地鶏改良種 ♀系:WPR×RIR	岐阜県畜産研究所	民間孵化場	75日以上	3,900	2,900	—	—	奥美濃古地鶏普及推進協議会	6	116,639	—	県内(一部県外)	歯ごたえが良い 味にコクがある	強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
	奥美濃古地鶏(卵用)	① ② ③ ④	♂系:岐阜地鶏 ♀系:RIR	岐阜県畜産研究所	岐阜県畜産研究所	—	—	—	—	—	奥美濃古地鶏普及推進協議会	29	—	2,563(R2.2.1現在飼育羽数)	県内中心	卵黄の割合が高い グルタミン酸含量が高い 卵かけごはんにぴったりの卵	強健で飼いやすい	
愛知県	肉用名古屋コーチン	① ② ④	♂系:名古屋種 ♀系:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	126	3,000	2,080	—	—	—	44	997,114	907,652	県内首都圏 関西圏	産肉性の向上(旧タイプより10%増体アップ)	強健で飼いやすい	
	卵用名古屋コーチン	① ② ④	♂系:名古屋種 ♀系:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	—	—	—	—	—	—	51	91,631	—	県内首都圏 関西圏		さくら色の卵殻に白い斑点が浮かぶ「桜吹雪」模様の卵を多く産む	
三重県	みえ特産鶏(熊野地鶏、松阪地鶏等)	① ② ④	♂系:(軍鶏×NH)×NH ♀系:名古屋種	県試験場	県試験場	110日以上	3,200	2,500	96	—	熊野地鶏生産組合	3	27,900	25,500	県内外の飲食店・小売店・問屋	赤みが強く、適度な歯ごたえ。 ムネ肉脂肪分多い。加熱後硬くなりすぎない。	8羽/m ² 以下で飼育、地域農産物の飼料用米および柑橘(新姫)活用	
滋賀県	近江しゃも	②	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×BPR	滋賀県畜産技術振興センター	滋賀県畜産技術振興センター	♂♀:140	3,500	2,800	—	未測定	近江しゃも普及推進協議会	10	35,140	—	県内近畿 東京	味・コク・歯ごたえ・栄養バランス、どれをとっても一級品		軍鶏(833系統・兵庫) RIR(YA系統・岡崎) BPR(XS系統・岡崎)
京都府	京地どり(肉用)	②	♂系:軍鶏 ♀系:BPR	兵庫牧場 岡崎牧場	民間種鶏場	♂:90~110 ♀:100~150	3,000~3,400	2,700~3,000	—	—	京地どり生産・流通推進協議会	3	—	15,000	府内首都圏	食味がよい 歯ごたえがある	飼育密度1m ² あたり8羽以下 強健で飼いやすい	軍鶏(833系統・兵庫) BPR(XA系統・岡崎)

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
							♂	♀										
兵庫県	ひょうご味どり(肉用)	① ② ③ ④	兵庫(薩摩鶏×名古屋種)×劣性白WPR	県試験場 兵庫牧場	県試験場	♂:90 ♀:110	4,000	3,500	95	64 (31~40週齢)	-	10	30,000	28,500	県内 関西圏 首都圏	肉味が良い 適度な歯ごたえ	もも肉割合が高い	薩摩鶏 WPR(981系統・兵庫)
奈良県	大和肉鶏(肉用)	① ② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×ニューハンプシャー	奈良県畜産技術センター	奈良県畜産技術センター	120日以上	3,400	2,400	100	-	大和肉鶏 農業協同組合	7	93,640	88,130	県内 京阪神 首都圏	ジュシーで旨味と甘味、歯応えがある。赤みが濃い。イミダゾールジペプチドがブロイラーに比べて多い。		軍鶏(831系統・兵庫) (過去に利用)
鳥取県	鳥取地どりピヨ <鹿野地鶏、智頭宿びよ>(肉)	① ② ③ ④	♂系:軍鶏×RIR ♀系:WPR	県試験場 兵庫牧場 岡崎牧場	県試験場 民間	100日前後	4,500	3,200	96.4	-	鳥取地どり生産者協同組合	2	11,461	11,048	県内、 関西圏	心地よい歯ごたえと独特のコク		軍鶏(831系統・兵庫) RIR(86系・兵庫、YA系統・岡崎) WPR(13・981系統・兵庫)
山口県	長州黒かしわ	① ② ④	♂系:やまぐち黒鶏(軍鶏×黒柏鶏×RIR)×WPR ♀系:RIR	山口県農林総合技術センター畜産技術部 岡崎牧場	民間種鶏場	♂:80~86 ♀:92~105	3.4kg	3.1kg	99.1	-	深川養鶏農業協同組合	4 (うち畜試等県機関1戸)	320~350羽/ロット	38,793(R1年度)	県内 首都圏 ギフト	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べてイノシン酸が多い) ・疲労回復成分(イミダペプチド)を多く含む。 ・タウリンがブロイラーより多い	・終生無薬飼育 ・4週齢以降、飼料の地元自給率50%以上	軍鶏(833系統・兵庫) RIR(86系統・兵庫およびYD系統・岡崎) WPR(981系統・兵庫)
徳島県	阿波尾鶏(肉用)	① ② ④	♂:軍鶏 ♀:WPR	県立農林水産総合技術支援センター	民間種鶏場	80	3,500	2,800	99	-	阿波尾鶏ブランド確立対策協議会	52	209万	206万	関東 関西 中四国	適度な歯ごたえ(対ブロイラー)	地鶏肉JAS認定	
香川県	オリーブ地鶏(讃岐コーチン)	① ②	♂系:讃岐コーチン(A4系統) ♀系:WPR	県試験場	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	80	3,300	2,700	♂:93.4 ♀:96.8	-	オリーブ地鶏振興会	1	53,000	50,000	主に県内	オリーブ飼料を給与することで肉に「グリニン」が約1.6倍、「コハク酸」が約1.2倍多く含まれる。	強健で飼い易い、おとなしい性質。オリーブ飼料(搾り果実)を出荷の2週間以上前から飼料に0.5%を添加給与している。	RIR(86系統・兵庫)
愛媛県	媛っこ地鶏(肉用)	① ② ③ ④	♂系:WPR13 ♀系:軍鶏×(RIR×名古屋種)	愛媛県養鶏研究所 兵庫牧場	愛媛県養鶏研究所	♂:120 ♀:150	3,500	3,000	99	-	媛っこ地鶏振興協議会	18	63,000	60,000	県内 関東 関西	肉味が良い 適度な歯ごたえ	28日齢以降1㎡あたり10羽以下で飼養	WPR(13系統・兵庫)

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
							♂	♀										
高知県	土佐ジロー(卵肉兼用)	① ② ④	♂系:土佐地鶏 ♀系:RIR	県試験場 岡崎牧場	県試験場	♂:150	1,500	—	—	60 (22~60週齢)	土佐ジロー協会	73	—	25,000	県内 全国 首都圏	卵黄率が高く、くさみがない。肉は味が濃くてかみごたえがある	放飼場付き鶏舎 緑餌給与	RIR(YA、YC系統・岡崎)
	土佐はちきん地鶏(肉用)	① ② ④	♂系:土佐九斤×シャモ ♀系:WPR	県試験場	県試験場 民間種鶏場	♂:80 ♀:90	3,200	2,800	95	—	土佐はちきん地鶏振興協議会	2	—	88,000	県内 全国 首都圏	低脂肪、アミノ酸を多く含む、適度な歯ごたえ	収容密度、4週齢以降無薬飼育	軍鶏(833系統・兵庫)
福岡県	はかた地どり(肉用)	① ② ④	♂系:軍鶏×BPR ♀系:WPR(チャンキー)	♂:県試験場 ♀:県試験場	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	80日以上	3,500	3,000	—	—	福岡県はかた地どり推進協議会	11	593,670	575,460	県内 関西 首都圏	イノシン酸量向上 喧騒性解消 産肉性向上	地域団体商標取得(H24年)	軍鶏(831系統・兵庫) BPR(XA(旧兵庫88)系統)
	はかた一番どり(肉用)	① ④	♂系:BPR×WPR(コップ) ♀系:WPR(コップ)	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	民間種鶏場	63日前後	3,200	2,800	—	—	はかた一番どり推進協議会	7	565,300	554,000	県内 関西 首都圏	イノシン酸がプロイラーに比べて多い 歯切れよく、きめ細かい肉質	飼料に八女茶配合	BPR(XA(旧兵庫88)系統)
長崎県	長崎対馬地どり(肉用)	①② ③④ (①・②は雌のみ)	♂:龍軍鶏ごろろう ♀:対馬地鶏	県試験場	県試験場	♂:91 ♀:126	3,000	2,600	—	81.4 (31~40週齢)	長崎対馬地どり振興協議会	2	7,420	—	県内 首都圏	ジューシーさ 食味が良い	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	龍軍鶏ごろろう(834系統・兵庫)
	対馬地鶏(卵肉兼用)	①② ③④ (①・②は雌のみ)	♂:対馬地鶏 ♀:赤玉実用鶏	県試験場	県試験場	♀:450	—	—	—	94.6 (21~64週齢)	—	4	430	—	県内	産卵能力が高い 卵黄割合が高い	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	
熊本県	天草大王(肉用)	①	♂系:原種天草大王 ♀系:九州ロード	熊本県農業研究センター	民間種鶏場	♂:110 ♀:125	4,100	3,100	—	—	熊本県高品質肉鶏推進協議会	7	—	92,550 (CM雛供給実績)	県内 首都圏 福岡県	赤身の美味しさ、弾力ある歯ごたえ、コクのある味	地鶏肉特定JAS認定 モモ肉の歩留り良好	♀系:九州ロード 造成にWPR(13系統)を利用
大分県	おおいた冠地どり(肉用)	① ② ③ ④	♂系:WPR×RIR×烏骨鶏 ♀系:九州ロード×RIR	大分県農林研究指導センター 畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林研究指導センター 畜産研究部 豚・鶏チーム	90	3,600	2,700	—	—	おおいた冠地どり銘柄協議会	7	—	130,600	県内 全国	柔らかく程よい弾力を持ち、うま味に優れる。	・国内初の烏骨鶏を交配した地鶏 ・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与	WPR(13系統・兵庫) RIR(86系統・兵庫)
	豊のしゃも(肉用)	① ② ④	♂系:軍鶏(大分系) ♀系:九州ロード	大分県農林研究指導センター 畜産研究部 豚・鶏チーム	民間ふ化場	150~180	4,250	3,100	—	—	豊のしゃも推進協議会	22	—	26,400	県内 全国	程よく歯ごたえがあり、脂肪が少なく、味に軍鶏特有のコクがある。	71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与し、150日齢以上飼養	WPR(13系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)

都道府県	コマーシャル鶏の名称	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
				原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
							♂	♀										
大分県	おおいた烏骨鶏(卵用)	① ② ③ ④	♂系:烏骨鶏 ♀系:烏骨鶏	大分県農林研究指導センター畜産研究部豚・鶏チーム	大分県農林研究指導センター畜産研究部豚・鶏チーム	—	—	—	—	約50	おおいた烏骨鶏生産者協議会	13	—	538	県内 全国	産卵率約50% (年間産卵個数約180個)を達成。		
宮崎県	みやざき地頭鶏(肉用)	① ② ④	♂系:地頭鶏×劣性白WPR ♀系:九州ロード	♂:宮崎県畜産試験場 ♀:兵庫牧場	民間種鶏場	♂:おおむね120日 ♀:おおむね150日	4,100	3,100	86.1	—	みやざき地頭鶏事業協同組合	41	499,932	430,690	全国	適度な歯ごたえやこくがあり、食味性に優れている。	飼養面積が広い(2羽以内/m ²)	劣性WPR(981系統・兵庫)
鹿児島県	さつま地鶏(肉用)	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:RIR	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:126 ♀:154	2,900	2,900	—	—	鹿児島県地鶏振興協議会	2	8,000	5,000	全国	肉の赤みが強い筋繊維が細く、肉のきめが細かい	地鶏・銘柄鶏食味コンテスト最優秀賞(H17年)	なし
	黒さつま鶏(肉用)	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:BPR(88系)	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:84 ♀:126	2,800	2,800	—	—	鹿児島県地鶏振興協議会	16	208,000	197,000	県内 全国	歯切れの良さや適度な歯ごたえあり生産性が高い	鹿児島黒牛、かごしま黒豚等に続く鹿児島の新しい黒シリーズ	♀:BPR(88系統・兵庫)
小松種鶏場	有明シャモ(飼育地で名前を付けている)	③ ④	♂系:龍軍鶏ごろう ♀系:岡崎おうはん	兵庫牧場 岡崎牧場	(株)小松種鶏場	♂:110 ♀:130	3,200	2,700	96	—	—	2	—	6,000	神奈川 岡山	味はコクがあり、歯ごたえがある		軍鶏(834系統・兵庫) 岡崎おうはん(岡崎)
	安曇野軍鶏(飼育地で名前を付けている)	③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:レッドプロイラー	兵庫牧場	(株)小松種鶏場	♂:75 ♀:75	3,800	2,800	96	—	—	2	—	36,000	県外	肉は硬すぎず、くさみが少ない		軍鶏(833系統・兵庫)
とりっこ倶楽部ホシノ	一黒シャモ	① ② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:BPR交雑種	とりっこ倶楽部ホシノ	とりっこ倶楽部ホシノ	140日	4,000	3,000	—	—	—	—	—	50,000	県内、全国に広がっている	美味、甘くて臭みがない	微生物飼育	軍鶏(833系統・兵庫)

※1 機関の関与・・・①原種鶏生産、②種鶏生産、③コマーシャル鶏生産、④普及活動

※2 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、AR:アロウカナ、WL:白色レグホン、NH:ニューハンプシャー

※3 卵用種及び卵肉兼用種の場合、年間平均飼育羽数