

(2) 羽色・外貌特徴

ア 0 週齢時（羽色のみ(20%抽出)）

羽色は、その組合せの中で多く占めている羽色タイプを順に、羽数をカウントすることとした。

a アロウカナ交雑（図3-1～3参照）

「①AR×EC」は、羽色が3タイプあり、羽色タイプⅠ（白色・黒色刺毛）が70%（20羽中14羽）、羽色タイプⅡ（白色・頭部褐色）が20%（20羽中4羽）、羽色タイプⅢ（白色）が10%（20羽中2羽）を占めた。

「②AR×MB」は、羽色が3タイプあり、羽色タイプⅠ（白色・黒色刺毛）が85%（20羽中17羽）、羽色タイプⅡ（白色）が10%（20羽中2羽）、羽色タイプⅢ（白色・頭部褐色）が5%（20羽中1羽）を占めた。

「③AR×MK」は、全て（20羽中20羽）が羽色タイプⅠ（白色・黒色刺毛）であった。



(図3-1) <①AR×EC>の羽色



(図 3 - 2) <②AR×MB>の羽色



(図 3 - 3) <③AR×MK>の羽色

b 烏骨鶏交雑（図3-4～5参照）

「④UK×MB」は、羽色が2タイプあり、羽色タイプI（白色・黒色刺毛）が90%（20羽中18羽）、羽色タイプII（白色・頭部褐色）が10%（20羽中2羽）を占めた。

「⑤UK×YA」は、全て（20羽中20羽）が羽色タイプI（褐色斑）であった。



（図3-4）＜④UK×MB＞の羽色



（図3-5）＜⑤UK×YA＞の羽色