

イ 生存率


a 特殊鶏交雑（表 9・図 7 参照）

特殊鶏交雑の①～③において、「①UK×YA」は、29 週齢から 56 週齢にかけて消化器病による 4 羽のへい死、62 週齢で削そうによる 1 羽の淘汰により、検定終了時の 64 週齢（454 日齢）までの生存率は 90.0%であった。

「②YA×XS」は、32 週齢までに生殖器病により 1 羽へい死し、生存率は 98.7%であった。

「③XS×LA」は、期間中のへい死・淘汰はなく、生存率は 100%であった。

	①	②	③
22W	100.0%	100.0%	100.0%
23W	100.0%	100.0%	100.0%
24W	100.0%	100.0%	100.0%
25W	100.0%	100.0%	100.0%
26W	100.0%	100.0%	100.0%
27W	100.0%	100.0%	100.0%
28W	100.0%	100.0%	100.0%
29W	98.3%	100.0%	100.0%
30W	98.0%	100.0%	100.0%
31W	98.0%	100.0%	100.0%
32W	98.0%	99.1%	100.0%
33W	98.0%	98.7%	100.0%
34W	96.9%	98.7%	100.0%
35W	96.0%	98.7%	100.0%
36W	96.0%	98.7%	100.0%
37W	96.0%	98.7%	100.0%
38W	96.0%	98.7%	100.0%
39W	96.0%	98.7%	100.0%
40W	96.0%	98.7%	100.0%
41W	96.0%	98.7%	100.0%
42W	96.0%	98.7%	100.0%
43W	96.0%	98.7%	100.0%
44W	96.0%	98.7%	100.0%
45W	96.0%	98.7%	100.0%
46W	96.0%	98.7%	100.0%
47W	95.1%	98.7%	100.0%
48W	94.0%	98.7%	100.0%
49W	94.0%	98.7%	100.0%
50W	94.0%	98.7%	100.0%
51W	94.0%	98.7%	100.0%
52W	94.0%	98.7%	100.0%
53W	94.0%	98.7%	100.0%
54W	94.0%	98.7%	100.0%
55W	92.9%	98.7%	100.0%
56W	92.0%	98.7%	100.0%
57W	92.0%	98.7%	100.0%
58W	92.0%	98.7%	100.0%
59W	92.0%	98.7%	100.0%
60W	92.0%	98.7%	100.0%
61W	92.0%	98.7%	100.0%
62W	91.1%	98.7%	100.0%
63W	90.0%	98.7%	100.0%
64W	90.0%	98.7%	100.0%



※ 日齢毎の生存率を各週で平均化した生存率であることに留意。

※ 22Wは155～160日齢時(6日間)の生存率。


※ 64Wは454日齢まで(7日間)の生存率。

※ 傷病によらない淘汰鶏(誤鑑別・事故死・検査淘汰)は、生存率算出より除外(154日齢時の羽数から除外)。

(表 9・図 7) 特殊鶏交雑の生存率の推移

b 大型鶏交雑（表 10・図 8 参照）

大型鶏交雑の「④YD×YA」においては、検定終了時の 40 週齢（286 日齢）までの期間中のへい死・淘汰はなく、生存率は 100%であった。



※ 日齢毎の生存率を各週で平均化した生存率であることに留意。
 ※ 22Wは155～160日齢時(6日間)の生存率。
 ※ 40Wは286日齢まで(7日間)の生存率。
 ※ 傷病によらない淘汰鶏(誤鑑別・事故死・検査淘汰)は、生存率算出より除外(154日齢時の羽数から除外)。

（表 10・図 8） 大型鶏交雑の生存率の推移