卵質検査

(単位:g、%)

都道府県名	品種名	系統名	週齢	卵重	卵殻質					卵内容				備考	
					卵形係数	卵殻強度	卵殻色			ハウユニット	卵黄重	肉斑出現率	血斑出現率		
							L値	a値	b値						測定機器
青森県	白色レグホン(WL)	卵黄重選抜系統	40	61.1	75.3	3.7	-	-	-	ナベルDET-1000	70.6	19.9	0.75	2.65	
			42	62.2	-	3.8	-	-	-		69.9	-	-	-	
	アロウカナ交雑種	あすなるII系統	36	55.6	-	3.9	83.3	-6.1	5.7		81.1	15.5	4.17	1.96	
			42	58.2	-	4.0	84.1	-5.9	6.7		79.0	-	-	-	
東京都	烏骨鶏	東京うこっけい	43	35.9	-	-	-	-	-	-	82.5	12.1	9.7	1.8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛知県	名古屋種	NGY4	270	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6日間×全羽分
			(日齢)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	名古屋種	NGY5	270	56.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6日間×全羽分
			(日齢)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奈良県	ニューハンブシャー	-	35	55.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			43	59.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	讃岐コーチン	A系統	36	40.5	71.3	3.1	-	-	-	-	76.3	-	-	-	
			64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	讃岐コーチン	D系統	36	52.5	76.0	3.6	-	-	-	-	89.8	-	-	-	
			64	52.6	75.4	3.3	-	-	-	-	87.3	-	-	-	
長崎県	対馬地鶏	原種	36	54.2	73.1	3.6	75.0	8.3	18.2	日本電色工業株式会社 ハンディ型色彩計NR-11A	74.4	15.7	-	0	
			64	57.9	71.1	3.0	-	-	-	-	66.8	18.1	23.3	0	
大分県	烏骨鶏	大分系統	36	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			64	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮崎県	九州ロード	24世代	41	56.1	-	3.6	-	-	-	-	85.0	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注 測定時期は、36週齢頃と64週齢頃を原則としたが、異なる場合は週齢欄を赤字で記載した。

また、測定個数は群測定の場合60個程度を原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。