

2 能力検定（系統の組合せ検定）成績

（単位：羽、g、日、％）

都道府県名	系統(品種) ^{注1)} の 組合せ内容	え付 羽数	体重 ^{注2)}		50% 産卵 日齢	ピーク 産卵率 (週齢)	産卵率 ^{注3)}	飼料 要求率 ^{注4)}	強健性 ^{注5)}		参 考			
			育成鶏	成鶏					育成率	生存率	組合せの特徴 (羽色等含む)	飼養管理 方法	センター由来の 系統※	備 考
長崎県	対馬地鶏× 赤玉実用鶏(RIR×WL)	28	2,179	2,585	140	95.9 (32)	82.6	—	100	96.4	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽 毛を有する。羽色は褐色。	ケージ飼育	—	

注1) 系統名の後に括弧書きで品種名を記載した。

注2) 育成鶏は20週齢、成鶏は43週齢に測定し、10%程度の抽出測定を原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

注3) 21～64週齢に測定することを原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

注4) 産卵率の測定期間と同期間の平均として算定することを原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

注5) 育成率は0～20週齢、生存率は21～64週齢に測定することを原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

※YA、YC＝ロードアイランドレッド、XS＝横斑プリマスロックの岡崎牧場所有の系統。