

1 系統造成鶏の飼養成績

都道府県名	品種名	系統名	性	家系規模		体重 注1)		50% 産卵 日 齢	ピーク 産卵率 (週 齢)	注2) 産卵率	注3) 飼 料 要求率	強健性 注4)		参考				
				え付羽数	最終 選抜羽数	育成鶏	成鶏					育成率	生存率	系統の特徴 (羽色等含む)	飼育方法	配布の可能性	改良目標及び 選抜方法	備考
北海道	ロードアイランドレッド (RIR)	P9系統	♂	161	116	2,766	4,347	174	80.8	75.1	—	93.2	83.1	—	ケージ飼育 デビーク 育成期：不断給餌 産卵期：制限給餌	不可	選抜方法：家系と産卵性を考慮 しつつ、体重を主体として選抜	育成体重：98日 齢
			♀	760	574	2,039	2,974		(42)	181～300日 齢								
青森県	白色レグホン (WL)	卵黄重 選抜系統	♂	40	—	—	—	142	84.8	74.8	—	93.6	90.5	—	不断給餌 ケージ飼育	不可	—	生存率：21～52週 齢
			♀	101	95	1,611	2,018		(27)	21～52週 齢								生存率：21～52週 齢
	アロウカナ交雑種	あすなろⅡ系統	♂	40	—	—	—	140	88.8	81.1	—	94.2	98.3	—	不断給餌 ケージ飼育	不可		生存率：21～52週 齢
			♀	133	121	1,596	1,802		(32)	21～52週 齢								
千葉県	横斑プリマスロック (BPR)	千葉×兵庫×岡崎系	♂	40	6	3,254	4,208	149	87.4	78.6	—	84.4	97.4	黑白横斑 淡褐色卵 単冠	ケージ飼育 不断給餌 デビーク	不可	—	生存率：21～54週
			♀	90	30	2,440	3,171		(30)	21～54週 齢								
	レッドラインロード (RLR)	ロードアイランドレッド RIR×レッドラインRL	♂	50	15	2,574	3,673	149	95.2	81.1	—	92.5	95.3	褐色 淡褐色卵 産卵性が良い 単冠	ケージ飼育 不断給餌 デビーク	不可		生存率：21～54週
			♀	160	75	2,212	2,646		(31)	21～54週 齢								
	WA	アローカナAr×白色 レグホンWL	♂	50	16	1,804	2,325	156	89.6	76.6	—	93.0	96.2	白色～淡褐色 端青色卵 三枚冠	ケージ飼育 不断給餌 デビーク	不可		生存率：21～54週
			♀	170	80	1,198	1,661		(31)	21～54週 齢								
東京都	烏骨鶏	東京うこっけい	♂	674	35	1,362	1,609	—	—	70.9	—	64.6	98.2	産卵率が50%以上 烏骨鶏十則を備える	ケージ飼育	公的研究機関 等のみ可能	改良目標：産卵率 選抜方法：産卵率と体重	体重：150日 齢(育成鶏)、 300日 齢(成鶏)
			♀	686	100	1,039	1,145		150～300日 齢									
愛知県	名古屋種	NGY1	♂	41	8	2,447	3,059	175	—	73.4	—	—	—	卵肉兼用タイプ バフ色	不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可	選抜方法：家系選抜、体重や産 卵性を考慮しながら選抜	体重：150日 齢(育成鶏)、250 日 齢(成鶏) 育成率：150日 齢 生存率：151～300日 齢まで
			♀	121	43	1,932	2,447		26～43週 齢									
	名古屋種	NGY4	♂	207	17	—	3,143	182	84.0	69.7	—	95.8	98.8	バフ色	開放鶏舎 単飼ケージ	不可		育成率：0～21週 齢 生存率：21～42週 齢
			♀	357	119	—	2,268		26～40週 齢									
	名古屋種	NGY5	♂	231	20	—	3,020	—	—	79.4	—	96.5	98.8	バフ色	開放鶏舎 単飼ケージ	不可		育成率：0～21週 齢
			♀	266	120	—	2,230		26～40週 齢									
	名古屋種	NGY6	♂	195	20	2,320	3,110	170	—	75.5	—	98.0	98	次期卵用系統 バフ色	不断給餌 ウインドウス鶏舎 単飼ケージ	不可		体重：150日 齢(育成鶏)、250 日 齢(成鶏) 育成率：150日 齢 生存率：151～302日 齢
			♀	481	100	1,890	2,420		26～44週 齢									
	三河種	MK	♂	33	10	—	3,388	176	—	65.8	—	88.0	96	卵肉兼用タイプ バフ色	不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可		体重：270日 齢(成鶏) 育成率：150日 齢 生存率：151～300日 齢まで
			♀	88	38	—	2,621		26～38週 齢									

1 系統造成鶏の飼養成績

(単位：羽、g、日、%)

都道府県名	品種名	系統名	性	家系規模		体重 注1)		50% 産卵 日 齢	ピーク 産卵率 (週齢)	注2) 産卵率	注3) 飼 料 要求率	強健性 注4)		参 考				
				え付羽数	最終 選抜羽数	育成鶏	成鶏					育成率	生存率	系統の特徴 (羽色等含む)	飼育方法	配布の可能性	改良目標及び 選抜方法	備考
奈良県	ニューハンプシャー	—	♂ ♀	1,080 (無鑑別)	65 384	3,640 2,630	3,741 3,224	180	71.4 (36)	49.6 21~61週齢	—	98.8	89.0	単冠 羽毛赤褐色 脚黄色	ケージ飼育 不断給餌	不可	改良目標：産卵率の向上 選抜方法：体重を主体として産 卵性を考慮しながら選抜	育成率：1~13週齢 生存率：21~61週齢
香川県	讃岐コーチン	A系統	♂ ♀	150 250	50 100	2,782 2,273	3,364 2,751	163	76.5 (26)	64.0	4.71	82.0	98.9	単冠、赤耳朵、パフ 色、脚毛あり、脚色 黄色、おとなしい	不断給餌 デビーク ケージ飼育	不可		体重：40週齢(成鶏)~全 羽測定 生存率：21~40週齢
	讃岐コーチン	D系統	♂ ♀	200 550	100 400	2,555 1,961	3,281 2,189	133	95.7 —	84.7	2.27	—	—	単冠、赤耳朵、濃 パフ色、やや脚毛 あり、脚色黄色、や やおとなしい	不断給餌 ケージ飼育	可		
			福岡県	横斑プリマスロック (BPR)	福岡農林試BPR× XA(旧兵庫)88系統	♂ ♀	120 241	54 164	2,430 2,400	— —	175	80.8 (29)	72.7 28~33週齢	—	91.1	91.5		大型、温順、横斑 太い
	長崎県	対馬地鶏	原種	♂ ♀	98 339	48 160	2,086 1,546	3,316 2,566	171	87.5 (29)	68.8	3.21	96.7	98.1	羽色は褐色、肉垂 れが無く、顎髭様の 羽毛を有する	不断給餌 デビーク ケージ飼育	不可	改良目標：産卵率80%以上(21~64 週)、ハウユニット80以上(36、64週) 選抜方法：独立淘汰水準法(産卵率、 ハウユニット)
大分県	烏骨鶏	大分系統	♂ ♀	200 250	20 80	1,251 972	— —	—	83 (30)	60.4 151~450日齢	—	—	—	産卵率が約50% 烏骨鶏十則を備える	ケージ飼育 自由摂取	可(県内、大雛 ♀のみ)	改良目標：産卵率50%、平均卵 重40g	体重：150日齢(育成鶏)
宮崎県	九州ロード	24世代	♂ ♀	245 245	9 24	2,890 2,569	4,393 3,294	168	96 (31)	76.3 21~60週齢	—	99.3	94	茶~茶褐色	8週齢以降制限 給餌、雄はケー ジ飼育、メスは14 週齢以降ケージ 飼育	可(県内のみ)	改良目標：産卵率80%、50%産卵日齢 165日齢、卵重53g到達日齢180日、対 受精ふ化率94% 選抜方法：体重を主体として、産卵性を 考慮しながら選抜。羽色の良いもの。	育成率：0~4週齢 生存率：21~60週齢

注1) 育成鶏は20週齢、成鶏は43週齢に測定し、10%程度の抽出測定を原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

注2) 21～64週齢に測定することを原則としたが、異なる場合は欄下段に記載した。

注3) 産卵率の測定期間と同期間の平均として算定することを原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。

注4) 育成率は0～20週齢、生存率は21～64週齢に測定することを原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。