

イ 12 週齢時（特殊鶏交雑のみ、羽色・外貌特徴：全羽数）

○ 特殊鶏交雑（図 4－1～6 参照）

「①UK×YA」は、全てが羽色タイプⅠ（濃褐色）であった。外貌の特徴は、何れも体型が卵用種型（地鶏型）、冠はバラ冠・単冠・クルミ冠・豆冠が見られ、全てに毛冠があった。耳朶色は濃藍色、脚色は鉛色（一部は薄い鉛色が混在）、趾は 84%（50 羽中 42 羽）が多趾（両脚 10 本）、16%（50 羽中 8 羽）が趾欠落（両脚 8～9 本）であった。

「②YA×XS」は、羽色タイプⅠ（黒色（頸部褐色））が 56.3%（80 羽中 45 羽）、羽色タイプⅡ（黒褐色斑（頸部褐色））が 36.2%（80 羽中 29 羽）、羽色タイプⅢ（黒色）が 7.5%（80 羽中 6 羽）を占めた。外貌の特徴は、何れも体型が卵用種型（地鶏型）、冠は全て単冠で、脚色は黄色一部黒色（一部は褐色が混在）であった。

「③XS×LA」は、羽色タイプⅠ（灰色（黒色刺毛含む））が 81.3%（80 羽中 65 羽）、羽色タイプⅡ（灰白色（黒色刺毛含む））が 18.7%（80 羽中 15 羽）を占めた。外貌の特徴は、何れも体型が卵用種型（地鶏型）、冠は全て単冠で、脚色は全て黄色であった。

<①UK×YA>



（図 4－1）<①UK×YA> 羽色タイプⅠの羽色・外貌の特徴

<②YA×XS>



(図4-2) <②YA×XS> 羽色タイプⅠの羽色・外貌の特徴



(図4-3) <②YA×XS> 羽色タイプⅡの羽色・外貌の特徴

「羽色タイプⅢ」

羽 色 : 黒色
割 合 : 7.5% (6羽/80羽)
体 型 : 卵用種型(地鶏型)
冠 : 単冠
耳朶色 : 肌色
脚 色 : 黄色一部黒色



(図 4 - 4) <②YA×XS> 羽色タイプⅢの羽色・外貌の特徴

<③XS×LA>



(図4-5) <③XS×LA> 羽色タイプⅠの羽色・外貌の特徴



(図4-6) <③XS×LA> 羽色タイプⅡの羽色・外貌の特徴