

都道府県が保有する系統造成鶏の飼養成績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和8年度調査)

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	山形県	赤笹シャモ	♂	80	60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	赤笹羽色 県内の愛好家より 譲渡された系統を 継承している。 令和3年度に近交 劣化対策として兵庫 牧場より赤笹831系 を導入して交配し た。	4週齢までバタリー 飼育、4週齢以降制 限給餌。 14週齢まで5～6 羽のケージ群飼。1 4週齢以降はケー ジ単飼。	不可
			♀	110	90	ND	ND	ND	ND							
	福島県	大型しゃも	♂	218	108	48	1,697	119	2,630	33-36	71.6	147	98.7	大型 赤笹 三枚冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	411	413	49	1,406	120	2,127							
	茨城県	J系統	♂	358	310	120	2,068	300	3,453	31-40	44.2	125	84.8	黒・茶色	ケージ飼育 平飼い	不可
			♀	786	680	120	1,620	300	2,466							
	東京都	J系統	♂	232	55	30	430	ND	ND	32.1- 40.8	41.3	42	95.6	黒・茶色	不断給餌 15週齢以降平飼い	可 (公的試験研究機 関等のみ)
			♀	244	62	30	389	ND	ND							
		J系統 × 831系統	♂	218	54	30	469	ND	ND	32.1- 40.8	31.7	42	96.6	ND	不断給餌 15週齢以降平飼い	不可
			♀	192	63	30	427	ND	ND							
		(J系統 × 831系統) × J系統	♂	161	24	30	443	ND	ND	32.1- 40.8	42.8	42	95.3	ND	不断給餌 15週齢以降平飼い	不可
			♀	134	57	30	405	ND	ND							
	三重県	八木戸	♂	300	100	ND	ND	ND	ND	31-40	60.0	120	95.6	中型 黒色 三枚冠	単飼ケージ デビーク 4週齢以降制限給 餌	不可
			♀		100	ND	ND	ND	ND							
	奈良県	831	♂	672	51	63	1430	270	3867	31-40	58.9	42	97.9	赤笹、三枚冠	不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可
			♀		205	63	1152	270	2835							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
軍鶏	徳島県	阿波地鶏	♂	1000	70	70	2419	ND	ND	25-64	32.6	70	98	赤笹、大型	デビーク 平飼い 不断給餌	不可 (阿波尾鶏協議会 会員に限る)
			♀	1000	700	70	1909	ND	ND							
	福岡県	福岡農林試 シャモ	♂	92	52	120	2,166	ND	ND	31-40	60.0	120	73.8	大型、気性荒い 赤笹、クルミ冠	ケージ飼育 デビーク、 5W齢以降制限給餌	可 (県内指定種鶏場)
			♀	160	118	120	1,759	ND	ND							
	大分県	大分系統	♂	150	15	49	964	300	ND	25-64	49.2	175	96.3	赤笹、三枚冠	ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	160	80	49	876	300	ND							
	NLBC 兵庫牧場	831系統	♂	249	79	104	2,000	212	3,822	31-35	57.6	42	94.1	赤笹	大すう期以降緩や かな制限給餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	296	231	104	1,742	212	3,168							
		833系統 (大型軍鶏)	♂	250	24	41	1,138	212	4,028	31-35	61.6	42	97.2	黒色、大型	7週齢以降制限給 餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	500	240	41	991	212	3,486							
合成種 (軍鶏等)	青森県	AOシャモ	♂	44	44	42	736	301	4,463	31-40	71.0	42	98	大型、おとなしい、 旨味成分で選抜、 横斑紋、三枚冠	不断給餌 単飼ケージ	可(県内指定農場 のみ)
			♀	101	101	42	596	301	3,329							
	山梨県	新山梨	♂	250	ND	112	2,262	ND	ND	ND	ND	112	98.4	さつまと山梨シャモ の交配種 闘争性が比較的強 い	不断給餌	(県内) 甲州地どり生産用 のみ
			♀	250	ND	112	1,685	ND	ND							
	三重県	M系統 合成品種 {(八木戸♂× NH♀)♂×NH ♀}	♂	375	96	98	1866	210	3202	31-40	66.0	42	99.3	単冠	群飼ケージ デビーク 4週齢以降制限給 餌	不可 (熊野地鶏生産組 合種鶏場のみ)
			♀		117	98	1556	210	2420							
	鳥取県	T1系統	♂	376	102	56	1580	98	3210	31-40	70.2	56	92.8	産卵性が良い (赤笹、三枚冠)	16週齢以降制限給 餌ケージ飼育(群～ 単飼)	(県内地鶏生産者協 議会加入者)
			♀		132		1330		2400							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種 (軍鶏等)	山口県	427系統	♂	579	70	140	3,704	280	4,507	31-40	48.9	49	92.4	・黒色 ・単冠 ・イミダペプチドがブ ロイラーより多い	4週齢以降制限給 餌	可 (県内の種鶏場)
			♀		134	140	2,682	280	3,988							
	NLBC 兵庫牧場	834系統	♂	250	18	41	1,441	212	4,303	31-40	54.2	42	93.7	大型	7週齢以降制限給 餌 平飼い	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	502	180	41	1,286	212	3,413							
RIR	北海道	P9系統	♂	147	114	98	2620	300	4200	26-43	82.0	120	98	肉用タイプ	ケージ飼育 デビーク 育成期: 不断給餌 産卵期: 制限給餌	要相談
			♀	708	580	98	2110	300	2960							
	岩手県	MO系統	♂	378	40	99	2755	152	3780	21-38	71.0	56	92.4	増体系(大型)	雄120日以降平飼い 雌ケージ飼い	可(県内、種卵、成 鶏、要問合せ)
			♀	513	200	99	2097	152	2574							
	秋田県	RB	♂	182	21	100	3,218	300	4,591	31-40	60.3	100	97.8	増体	120日齢以降 平飼い	県内
			♀	396	210	100	2,324	300	3,619							
	茨城県	L系統	♂	139	120	120	2,084	300	2,943	21-56	87.2	125	92.7	茶色	ケージ飼育	不可
			♀	439	380	120	1,544	300	2,050							
	福島県	P13系統	♂	234	119	48	1319	119	2285	33-36	85.9	147	98.6	濃暗赤色 単冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	431	418	49	1099	120	1861							
	岐阜県	肉用ロード	♂	258	32	35	781	211	3,693	26-39	86.3	84	98.6	産卵性が良い	5週齢以降制限給 餌 ♀: ケージ単飼 ♂: ケージ群飼	不可
			♀	532	160	35	708	211	3,016							
	愛媛県	ER	♂	161	70	150	2,653	300	3,464	31-40	91.8	150	94.3	産卵率が良い	不断給餌	協議による
			♀	352	140	150	1,840	300	2,513							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
合成種 (RIR等)	福井県	♂YC ♀ウエミチ レッド	♂	50	20	140	2,226	300	3,114	28	91.0	120	95	単冠 赤褐色	平飼 ケージ飼育	無
			♀	50	20	140	1,624	300	2,224							
	熊本県	九州ロード	♂	155	17	98	2,246	287	5,464	31-40	83.66	98	91.23	濃褐色の羽色。 産卵率、増体良好。 熊本ロードと兵庫牧 場WR13系統との交 配。	7週齢時以降制限 給餌。雄のみ20週 齢時以降平飼い・不 断給餌。	可 (県内在住の希望 者に雌のみ譲渡 可。)
			♀	340	85	98	1,917	287	3,811							
	大分県	九州ロード	♂	200	15	49	1,323	300	4,865	25-64	75.2	175	98.6	産卵性良い 茶褐色	5週齢以降制限給 餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	250	75	49	1,181	300	3,671							
合成種 (RIR等)	宮崎県	九州ロード (29世代)	♂	298	75	49	1,475	245	4,393	31-40	89	49	91	茶～茶褐色 単冠	8週齢以降制限給 餌 14週齢以降ケージ 飼育	可(県内、雌のみ)
			♀	304	120	49	1,202	245	3,460							
BPR	青森県	BW選抜	♂	42	42	42	1,070	301	4,809	31-40	79.6	42	95	旨味成分で選抜、 横斑紋、単冠、速羽 性	不断給餌 単飼ケージ	可(県内指定農場 のみ)
			♀	75	75	42	904	301	3,865							
	新潟県	88系統	♂	80	64	90	1,987	400	3,490	31	77	117	98	大型、おとなしい 横斑	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	500	458	90	1,690	400	2,692							
	鹿児島県	88系	♂	273	10	56	1,839	280	4,275	21-56	63.7	140	86.2	ND	20週齢以降制限給 餌	鹿児島県地鶏振興 協議会会員で認定 した種鶏場のみ
			♀	287	80	56	1,509	280	3,475							
RC	山梨県	56系統	♂	52	ND	112	2,064	ND	ND	ND	ND	112	96.4	兵庫牧場	5週齢以降制限給 餌	不可
			♀	51	ND	112	1,823	ND	ND							
WPR	山梨県	981系統	♂	40	ND	112	1,887	ND	ND	ND	ND	112	95.3	兵庫牧場	5週齢以降制限給 餌	不可
			♀	40	ND	112	1,810	ND	ND							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
名古屋	北海道	N系統	♂	138	114	98	2320	300	3780	26-43	69	120	98	肉用タイプ	ケージ飼育 デビーク 育成期: 不断給餌 産卵期: 制限給餌	要相談
			♀	701	580	98	1740	300	2760							
	山形県	-	♂	70	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	当研究所にて継承 してきたもの。	♀は上記に同じ。 ♂は上記に準ずる が、14週齢以降は 10羽/10㎡の平飼。	不可
			♀	110	90	ND	ND	ND	ND							
	茨城県	T系統	♂	156	135	120	2,286	300	3,375	21-56	58.1	125	98.1	茶色	ケージ飼育 平飼い	不可
			♀	323	280	120	1,706	300	2,541							
	新潟県	-	♂	80	72	90	1,714	400	3,408	31	77	117	96	産卵性が良い バフ色	5週齢以降制限給 餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	150	132	90	1,471	400	2,998							
	愛知県	NGY1	♂	39	16	150	2,057	250	2,781	26-43	70.5	150	98.5	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	96	40	150	1,604	250	2,276							
		NGY2	♂	180	45	150	3,236	265	3,940	26-40	53.9	150	96.5	肉用タイプ	群飼ケージ	不可
			♀	450	358	150	2,284	265	2,854							
		NGY3	♂	20	16	150	2,665	250	3,748	26-43	68.8	150	97	肉用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	35	31	150	2,336	250	3,484							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
名古屋	愛知県	NGY7	♂	249	48	150	3,160	250	4,406	26-40	65.1	150	94.9	肉用タイプ	単飼ケージ 制限給餌	不可
			♀	302	144	150	2,463	250	3,168							
		NGY8	♂	247	52	150	2,574	250	3,591	26-43	75.1	150	98.3	肉用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	396	130	150	2,205	250	3,162							
	三重県	-	♂	460	70	98	1464	210	2490	31-40	64	42	99.3	ND	群飼ケージ デビーク	不可 (熊野地鶏生産組 合種鶏場のみ)
			♀		130	98	1197	210	1820							
	奈良県	-	♂	420	66	63	1153	270	3320	31-40	61.3	42	97.6	単冠	不断給餌 デビーク 群飼ケージ	不可
			♀		101	63	914	270	2560							
	愛媛県	N	♂	132	60	150	2,586	300	3,354	31-40	76	150	91.9	ND	不断給餌	協議による
			♀	251	120	150	1,997	300	2,601							
	NLBC 兵庫牧場	87系統	♂	251	100	104	1,756	212	3,391	31-40	70.9	42	94.8	ND	大すう期以降緩や かな制限給餌 成鶏期以降ケージ 飼育	可 (配布時期限定、要 問合せ)
			♀	300	208	104	1,551	212	2,700							
比内鶏	秋田県	HB	♂	257	20	100	2,858	300	4,725	31-40	46.9	100	97.2	増体	120日齢以降 平飼い	県内 オスのみ
			♀	708	300	100	2,075	300	3,544							
		HK	♂	187	20	100	2,841	300	4,460	31-40	39.6	100	94.1	ND	120日齢以降 平飼い	県内 オスのみ
			♀	663	293	100	2,095	300	3,368							
会津地鶏	福島県	大型 会津地鶏	♂	225	109	48	1600	119	2547	33-36	61.7	147	99.4	五色羽装 楊脚 単冠	7週齢以降制限給 餌、デビーク、ケー ジ飼育	可(県内事業者の み) 研究目的の場合 は、要協議
			♀	415	396	49	1348	120	2114							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
蜀鶏	新潟県	-	♂	161	69	58	696	398	2,965	45	67	135	90	天然記念物 神経質 長鳴き 黒緑色	5週齢以降制限給餌 デビーク ケージ飼育	要相談
			♀	175	115	58	587	398	2,169							
三河種	愛知県	MK	♂	25	16	180	2,359	270	2,850	31-38	65.1	150	98	卵肉兼用タイプ バフ色	デビーク 不断給餌 開放鶏舎 単飼ケージ	不可
			♀	41	31	180	1,943	270	2,403							
ニューハ ンプシャー	奈良県	-	♂	1026	56	63	1617	270	3452	31-40	71.2	42	98.8	単冠	不断給餌 デビーク 平飼い 群飼ケージ	不可
			♀		356	63	1342	270	2906							
黒柏鶏	山口県	畜試系統	♂	215	36	140	2,065	280	2,566	31-40	ND	49	94.4	・天然記念物 ・長鳴鶏 ・性格温順 ・緑黒色 ・単冠	不断給餌	不可
			♀		66	140	1,450	280	1,925							
讃岐コー チン	香川県	A4系統	♂	100	30	64	1,280	222	2,946	31	77.3	120	94.2	単冠、赤耳朵、バフ 色、脚毛あり、脚色 黄色、おとなしい	不断給餌、デビー ク、ケージ飼育	不可
			♀	200	100	140	1,902	226	2,446							
対馬地鶏	長崎県	-	♂	88	34	120	1,855	ND	ND	39-42	64.7	120	95.4	大型、おとなしい (赤笹、クルミ冠)	6週齢以降制限給餌 デビーク	可 (県内、種卵のみ)
			♀	388	128	120	1,441	ND	ND							
天草大王	熊本県	原種 天草大王	♂	145	11	98	2,102	287	6,148	31-40	48.9	98	97.45	ランシャン、シャモ、 熊本コーチンの交 配により復元。増体 良好。	7週齢時以降制限 給餌。雄のみ20週 齢時以降平飼い・不 断給餌。	不可
			♀	230	55	98	1,820	287	4,168							
熊本種	熊本県	熊本 コーチン	♂	55	7	98	2,152	287	5,170	31-40	66.5	98	98.0	増体良好。 熊本種を大型に改 良。	7週齢時以降制限 給餌。雄のみ20週 齢時以降平飼い・不 断給餌。	不可
			♀	110	35	98	1,871	287	3,943							
		熊本種	♂	40	8	98	2,036	287	4,063	31-40	64.6	98	95.33	バフ色の羽色	不断給餌	可
			♀	110	40	98	1,625	287	3,178							

品種名 ※	都道府県	系統名	性	家系規模		体重				産卵率		育成率		参考		
				え付 羽数	最終選 抜羽数	育成鶏		成鶏		期間 (週齢)	(%)	日齢	(%)	系統の特徴 (羽色等を含む)	飼育方法	配布の可能性
						日齢	(g)	日齢	(g)							
地頭鶏	宮崎県	S60	♂	142	36	147	3155	ND	ND	31-40	56	98	91	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀	148	65	147	2175	ND	ND							
		H15	♂	55	16	147	2902	ND	ND	31-40	57	98	84	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀	81	34	147	2077	ND	ND							
		M28	♂	71	13	147	3109	ND	ND	31-40	60	98	85	毛冠、顎髭	不断給餌	不可
			♀	94	33	147	2034	ND	ND							
薩摩鶏	山梨県	-	♂	50	ND	112	2,200	ND	ND	ND	ND	112	80.4	兵庫牧場	不断給餌	不可
			♀	50	ND	112	1,840	ND	ND							
	鹿児島県	赤笹系	♂	210	16	70	1,772	300	3,728	21-56	61.2	150	96.1	赤笹、三枚冠	20週齢以降定量給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	213	80	70	1,378	300	3,301							
合成種 (薩摩鶏等)	鹿児島県	さつま地鶏	♂	207	6	56	1,293	280	3,883	21-56	62.6	140	92.2	食味が良い (赤褐色、三枚冠)	20週齢以降定量給餌	鹿児島県地鶏振興協議会会員で認定した種鶏場のみ
			♀	208	72	56	1,032	280	2,997							
合成種	大分県	仮称)三元雄系統 (WPR981♂× (RIR86♂×烏骨鶏♀))	♂	150	20	49	1379	ND	ND	ND	ND	175	94.1	毛冠、アゴ髭、クルミ冠	5週齢以降制限給餌、ケージ飼育	可 (県内ふ化場のみ)
			♀	200	80	49	1179	ND	ND							
合成種 (岐阜地鶏改良種)	岐阜県	GMB	♂	250	31	35	955	210	3,933	26-39	78.2	70	98.5	増体性が良い	5週齢以降制限給餌 ♀:ケージ単飼 ♂:ケージ群飼	不可
			♀	467	155	35	845	210	3,349							

(ND=No data)

※ 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、NH:ニューハンプシャー種

都道府県における能力検定成績（系統の組合せ検定）

(1)母鶏(2元、3元交配等の採卵用)

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和8年度調査)

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※	え付 羽数	体重				産卵率		育成率		生存率		参考			
			育成鶏		成鶏											
			日 齢	(g)	日 齢	(g)	期間 (週 齢)	(%)	日 齢	(%)	期間 (日 齢)	(%)	組合せの特徴 (羽色等も含む)	飼養管理方法	センター 由来の系統	検定 実施年
北海道	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	115	98	1610	300	2810	26-43	88.0	120	99.1	450	99	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R7
	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	90	98	1570	300	2710	26-43	83.0	120	96.3	450	100.0	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R6
	N系統(名古屋)× P9系統(RIR)	104	98	1390	300	2890	26-43	84.0	120	99	450	97.9	ND	6週齢以降制限給餌 ケージ飼育 デビーク	ND	R5
東京都	YA系統(RIR) ×J系統(軍鶏)	431	ND	ND	ND	—	50.79	71.0	124	68.2	215	77.9	ND	不断給餌 15週齢以降平飼い	YA系統 (岡崎) 831系統 (兵庫)	—
岐阜県	岐阜地鶏♂ ×RIR(当所保有)♀	20	35	454	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5週齢以降制限給餌 ケージ飼育	なし	R8
山口県	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第11世代	171	140	2,767	280	3,627	31-40	75.9	49	93	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R6
	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第10世代	208	119	2,916	280	3,530	31-40	73.0	49	99.0	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R5
	YC系統(RIR) ×86系統またはYD 系統(RIR)の 第9世代	180	120	2,321	280	3,033	31-40	81.3	49	95.0	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC及びYD系 統(岡崎)	R4

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※	え付 羽数	体重				産卵率		育成率		生存率		参考			
			育成鶏		成鶏											
			日 齢	(g)	日 齢	(g)	期間 (週 齢)	(%)	日 齢	(%)	期間 (日 齢)	(%)	組合せの特徴 (羽色等も含む)	飼養管理方法	センター 由来の系統	検定 実施年
山口県	YC86系統(RIR) ×YC8686系統(RIR) 第7世代	196	120	2,346	280	3,120	31-40	79.8	49	92.3	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R4
	YC86系統(RIR) ×YC8686系統(RIR) 第8世代	216	119	2,840	280	3,369	31-40	81.8	49	96.8	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R5
	YC86系統(RIR) ×YC8686系統(RIR) 第9世代	163	140	2,785	280	3,803	31-40	78	49	88.3	ND	ND	遅羽に固定 86系統より産卵 性に優れる	5週齢以降制限給餌 140日齢以降ケージ 飼育	86系統(兵 庫) YC系統(岡 崎)	R6

(ND=No data)

※ 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、NH:ニューハンプシャー

都道府県における能力検定成績（系統の組合せ検定）

(2)コマーシャル鶏(2元、3元、4元交配等の肥育用)

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和8年度調査)

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日齢	体重(g)	育成率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検定 実施年
青森県	横斑シャモ系統(軍鶏)× BW場用系統(速羽性横斑 プリマスロック) メス	青森シャモロッ ク	30	120	2959	91	3.25	雌雄ともに横斑羽装、 三枚冠	なし	R7
	横斑シャモ新系統(軍鶏) × BW場用系統(速羽性横斑 プリマスロック) メス	青森シャモロッ ク	30	120	2968	100	3.33	雌雄ともに横斑羽装、 三枚冠、 青森県在来シャモを使用	なし	R7
岩手県	基礎鶏※×〔(13系統(ホウ イトプリマスロック))×MO 系統(ロードアイランドレ ッド)〕 ※軍鶏×(レッドコーニッ シュ×岩手地鶏(赤笹))	南部かしわ	994 (R8)	119	♂4,100 ♀3,500	99.0	♂4.0 (4週齢～出 荷時体重 4.5kg) ♀4.3 (4週齢～出 荷時体重 3.2kg)	天然記念物「岩手地鶏」の羽色 に近く赤笹である。 増体性に優れる。	軍鶏 831系統 RC 56系統 WR 13系統(兵庫) RIR YC系統(岡崎)	H15 (基礎鶏) H28 (ロード)
山形県	赤笹シャモ(軍鶏)♂×名 古屋♀ × ♀岡崎牧場XA系統(横斑 プリマスロック)	やまがた地鶏	約 7,000 羽／R7年	120	♂3,978 ♀2,699	ND	4.42	父鶏は軍鶏♂×名古屋♀で、交 雑第1世代(F1)は供用せず、 第2～5世代(F2～5)の♂を供 用する。	母鶏は岡崎牧場か ら導入するXA系統	出荷時成績 はH24 (飼育管理マ ニュアル (H26.3)より)
東京都	J系統(軍鶏)× (YA系統(RIR) ×J系統(軍鶏))	東京しゃも	ND	140	2897	ND	ND	赤みが濃く、クッキングロスが少 ない。	YA系統(岡崎) 831系統(兵庫)	S63
埼玉県	タマシャモ(TS)×タマシャ モ種鶏(TS×RIR)	彩の国地鶏タマ シャモ	60	112	♂2,968 ♀2,237	95.6	3.75	増体性に優れる やや喧噪性がある クルミ冠	RIR(岡崎、86系統: 兵庫) 軍鶏(831系統:兵 庫)	R3

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日 齢	体 重(g)	育 成 率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検定 実施年
山梨県	新山梨シャモ × 981系統(WR)	新地どり候補鶏	135	119	♂4,968 ♀3,655	96.3	4.38	低腹腔内脂肪、正肉重量増	981系統(兵庫)	H29
	56系統(RC) × 新甲州地どり候補鶏	新甲州頬落鶏 候補鶏	155	84	♂4,296 ♀3,271	98.0	3.18	赤笹羽装 早熟型で肉質も硬め	56系統(兵庫)	R1
福井県	ウエミチレッド系統(RIR) ♂ × 岡崎おうはん系統 ♀	福地鶏	7,200	ND	ND	ND	ND	450日齢まで採卵鶏として利用し てから肉用に出荷	—	—
三重県	合成品種((八木戸 ♂ × N H ♀) ♂ × NH ♀) ♂ × 名古屋種 ♀	熊野地鶏、 松阪地鶏など	70	119	♂3297.5 ♀2524.6	100.0	3.89	肉質は赤身が強く、適度な歯ご たえ。羽毛は褐色。	—	R2
滋賀県	833系統(SM) ♂ × (YA系統(RIR) ♂ × XS系統 (BRP)) ♀	近江しゃも	27	150	♂:4,043 ♀:3,083	90.0	ND	種鶏の産卵率が良い。	YA系統(岡崎) XS系統(岡崎) 833系統(兵庫)	R4
京都府	833系統(軍鶏) × XA系統(BPR)	京地どり	約22,500	85	♂:約4,000 ♀:約2,900	97.7	3.35	食味が良い、歯ごたえが良い	833系統(兵庫) XA系統(岡崎)	R2
鳥取県	合成鶏(軍鶏831・833系統 × RIR86・YA系統) × 13・ 981系統(劣性白WR)	鳥取地どりピヨ 鹿野地鶏、豆幻 鶏	16	98	♂:5,180 ♀:3,348	100.0	4.2	増体性に優れる 脚弱がまれに発生する	831・833系統(兵 庫)86系統(兵庫) 13・981系統(兵庫) YA系統(岡崎)	R7

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容 ※1	流通段階 での名称	え付羽数	出荷時成績				参考		
				日齢	体重(g)	育成率 (%)	飼料要求 率※2	組合せの特徴 (羽色等も含む)	センター由来の 系統	検定 実施年
山口県	427系統(やまぐち黒鶏 [833系統(軍鶏)×〔黒柏× 86系統(RIR)〕]×981系 (WPR))×合成系統(RIR)	長州黒かしわ	741	♂:84日齢 ♀:98日齢	♂:3.54 kg ♀:2.85kg	98.4	3.12 (雌雄平均)	適度な歯ごたえ。 食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) 疲労回復成分(イミダペプチド)を多 く含む。 羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R5
	427系統(やまぐち黒鶏 [833系統(軍鶏)×〔黒柏× 86系統(RIR)〕]×981系 (WPR))×合成系統(RIR)	長州黒かしわ	888	♂:84日齢 ♀:98日齢	♂:3.35 kg ♀:3.19kg	98.8	2.73 (雌雄平均)	適度な歯ごたえ。 食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) 疲労回復成分(イミダペプチド)を多 く含む。 羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R6
	427系統(やまぐち黒鶏 [833系統(軍鶏)×〔黒柏× 86系統(RIR)〕]×981系 (WPR))×合成系統(RIR)	長州黒かしわ	985	♂:84日齢 ♀:98日齢	♂:2.9 kg ♀:2.8kg	98.4	2.97 (雌雄平均)	適度な歯ごたえ。 食味が良い(ブロイラーに比べ てイノシン酸が多い) 疲労回復成分(イミダペプチド)を多 く含む。 羽性鑑別が可能	833系統(兵庫) 86系統(兵庫) 981系統(兵庫) YC系統(岡崎) YD、86系統(岡崎・ 兵庫)	R7
香川県	A4系統 (86系統RIR×純系讃岐 コーチン)×民間種鶏(WR)	讃岐コーチン	240	80	♂4,801 ♀3,579	96.9	2.60	増体性に優れる	86系統(兵庫)	H26
宮崎県	(S60群(地頭鶏))×(981 系統(WR))×九州ロード	みやざき地頭鶏	810 (年2回発 生)	♂:98 ♀:119	♂:3756 ♀:2958	♂:98 ♀:100	♂:2.7 ♀:3.2	茶～茶褐色 まだら色	981系統(WR)	—

(ND=No data)

※1 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、NH:ニューハンプシャー

※2 飼料要求率 = 飼料消費量(kg) / 出荷体重(kg)